

太醫院經驗奇效良方大全

醫方彙編

卷

醫方彙編古今通應凡大人之有疾能言致疾之因與目即所

醫方彙編由及目即所著醫之驗治倍見其難兼小兒瘡疹欲

以未見之間或發壯熱或發驚悸不止一端疑似難明非深於

醫者不能辨也新學小生諸歷未久多執偏見率以小兒為純

陽胃熱則發斑每投涼劑夫以瘡疹為熱固是一說然蓋以為

熱則又不可世徒知用熱藥太過往往損目曹不知服冷藥太

過比比傷生利害皆自不細况嬰孩腸胃嬌脆胎氣稟受虛實不

同運氣時令寒暑燥濕不齊隨証施藥以收十全之功

詎可執一偏之見乎比年書肆刊行方書充棟汗牛獨

證散漫難考檢開彌艱或收方之家未暇全備設遇

醫道不過寸簡醫

名作萬一吁方勝惜哉今

予家藏是編以矣有言有方有證有治門類綱目靡不畢備明
効大驗彰灼弗誣不敢私秘紹定庚寅春繼餒梓以廣其傳庶
好事者便於觀覽云

奇效良方瘡疹論卷之六十五

論瘡痘初出證第一

○論瘡疹

世嘗治瘡疹與傷寒時疫傷食風熱潮熱疝熱疑似之間便與一藥均而治之殊不知邪正不同虛實各異輕者至重重者性命危於風燭束手待斃誠為可哀今試論之且瘡疹與傷寒時疫等證始者均為發熱又有他證不同可相為別證則列之次篇小兒身熱耳冷眈眈咳嗽固瘡疹也雖然五臟證各別究之則歸一臟也瘡疹為內實而生熱毒由兒生母腹中所受非若內虛而感外寒之比蓋古方論云風熱傷胎生兒口禁風冷傷胎生兒脈喘納汚則為血癖胎弱則為諸漏積驚而夜啼蘊熱而斑毒以此觀之手之虛實由母之盛衰所致也母若有疾亦為子患故知瘡痘在肚腹中蘊熱毒也非若一歲中有異氣暴

寒時疫風熱傷食之比學者不可不察

○錢氏云瘡痘是母腹中所受積穢故五臟各有一證

夫人始生而蒙冲和均稟五行陰陽形態變易蓋母導胎育有盛衰虛實在其子也皆是母胎所受是知積穢故生下有瘡疹則五臟各見一證其可欠煩悶者肝也特發驚悸者心也乍涼乍熱手足冷者脾也面目頤赤咳嗽特嚏者肺也腎在臍下不納穢濁瘡黑者屬腎由胃風冷內虛之所致也且以嬰兒初生下惡血未燕綿指拭之兒吞惡血在胃膈者吐以甘草如惡血入腹中者利以黃連葉豆粉皆所以革惡穢也此乃世用保子之常法觀已生既出腹外其母之虛實邪正在於子也况在腹中同母氣血呼吸出入豈非受積穢而成者錢氏論之當矣

○瘡疹論日數

熱毒蒸三日則熱運於肌而紅斑生惟紅斑生至足為出齊不

可拘多少重者通身輕者數枚而已以紅斑生血疱血疱起如
痘在肌皮之上故以痘名焉血疱結膿疱膿疱結痂方為愈
也紅點出者以紫草飲子欲出速用葫荑酒紅點出齊之後作
血疱血疱七日則當結膿窠此皆大略之言爾病人虛實不等
不可拘以日數但正應病日形證以為活法古人云熱三日而
成斑有熱五七日而生斑者有至十餘日而生斑者但足上有
斑為出齊不可拘以日數也自斑至足有為出齊出齊之後長
成血疱血疱七日當結膿窠苟若血疱中又尚有紅斑點相交
而生則不可拘以日數待其皆作血疱為齊為血疱當結膿血
痂至七日以上而不結膿血痂死當此恐毒氣內外貫注倒
靨急與猪尾膏服則隨時結痂死故以血疱出七日為齊若七
日為期膿疱血疱出齊而不結膿血痂死則失其平矣大抵小
兒有病發熱日數稍久用藥者便當預防為瘡疹證蓋熱不解

而熱毒運於肌中變為瘡疹故也所以不可不防也如紅斑出齊生血疱血疱七日結膿疱此乃榮衛調和內外無諸感冒方能如期且如血疱正作之際遇天令寒暑燥濕風不節氣候異宜遲速因而失叙亦不可拘日數但以紅斑皆為血疱日為齊若出血疱七日病人氣虛尚有紅斑未能皆生成血疱者毒氣為未盡當此合宜溫肌快榮衛藥以托之且以皆出血疱七日為期膿疱如期結痂疣矣如當結膿疱而不結此是毒氣彌盛而不歛用猪尾膏以解之此為急務然猪尾膏是治毒氣盛血疱脹起不結膿血痂死血熱瘡毒能復入心故也非若外感風寒倒靨內虛吐瀉陷伏者更宜詳之

○瘡疹出於心則有先驚搐者

夫熱吐熱瀉不可投燥藥傷寒而身熱不可便投涼藥瘡疹發搐不可投驚藥此皆外同而內異也素問云瘡瘍煩燥瘡瘡發

出於心今瘡疹出於心驚搐亦出於心也瘡疹毒氣始作心火
大盛則生風生風則驚悸甚則搐搦熱氣蒸盛則煩燥為瘡疹
則痛痒矣所以為驚搐為煩燥為痛痒為瘡疹數證心所主者
必備無一闕焉如如者毒氣蘊於心臟則驚悸搐搦醫者不以
內外証辨明之不為瘡疹防之便以銀粉腦麝青黛硃砂礞石
等投之則心寒而肌致毒氣內伏是瘡疹而驚搐者無由而出
也此證似驚風用藥當作瘡疹防備之蓋瘡疹之初似驚風者
多醫者不審便作驚風治之為害不淺大抵瘡疹必有他証相
雜必先有咳嗽痰涎心神驚悸煩燥嘔吐唇紅頰赤發渴耳冷
是於脈數舌白如有此數證則銀粉凉心藥切不可用之心一
凉而肌欬伏何由運出又有小兒平常安樂皆無疾病忽然發
搐者必是瘡疹尤當審諦之蓋毒氣內盛但以發散毒氣如惺
惺散消毒散升麻湯紅綿散兼以快氣利小便祛風等藥與服

之此等藥雖未能即効亦不至敗事其證次第待其熱氣得泄於肌膚心氣亦自定矣有風寒與內熱相搏而驚搐者則各見其證治之亦如前法但加勻氣藥為妙張氏云齋瘡氣勻即出快氣行即榮衛無滯有寒亦散瘡疹當自出矣

○紅斑點隱在肌中似出不出者

紅斑點隱在肌中似出不出者此由榮衛有病也蓋蘊熱而生斑毒非熱毒則不能成斑瘡矣小兒所稟有虛有實且寶鑑云受父精不足者頭骨臣以顛開母氣衰微肌體虛而肉極此皆所稟不足者大抵瘡疹緣兒在母腹中食穢而成蘊熱却能隨天氣非節之暖而蒸出如冬月應寒而反熱謂之冬溫亦有隨春氣暄暖而出者有因他病發熱而蒸出者此皆發熱於外所蘊熱毒隨之出於肌中為瘡疹醫者不能防備見其熱而政其熱殊不知因他病蒸發而其中有瘡子發已存焉者若蒸既

成斑疹而出使因虛而無熱以應之故瘡疹雖見則外無壅盛
之氣而不得泄內無由復入當此之際其人面青而惡寒肌肉
慢而不食精神昏倦令瘡疹隱隱在肌膚似出不得出者內虛
寒也有身熱面赤者又大利小便清有此證者但溫中進食
然後榮衛自復則毒氣隨多少出而不至太過與不及矣有人
於此見瘡疹出雖不能溫裏但用發散與之又豈知內無陽以
相應更發陽氣外出令瘡疹色白其人必脫當此反言既出得
甚好忽然而斃如此者不可勝數此為盡脫也世常患之活人
書云瘡疹出遲者以活血散用白芍藥末入酒數點湯調服之
及人齒散切切新書云患瘡疹而瀉甚者至於疏黃附子乾薑
亦可用蓋胃緩而榮衛復行瘡疹必出矣夫治病用藥或冷或
熱不同所以救一時之不及有人於此或見瘡疹隱隱在肌膚
欲出而不出不以為榮衛虛則以為脾胃冷猶在發散或下之

發之為斑爛為腫脫下之而愈危殆矣其不悞久者幾希如瘡
疹始作身熱似傷寒口耳尖并脚冷或腹痛者是瘡疹必大便
閉而頤頰赤若大便自利面青手足冷且溫之若臟腑如常或
秘者可用蟬殼散搗皮湯髮灰飲免內醬兔毛煎湯浴之出後
咳嗽脇痛吐食不下亦發疹湯赤瘡子者犀角散未能勻者必
勝散靈苑云未發令內消已發解利并出得太盛俱宜用玳瑁
湯最良養生方瘡疹與他證相似疑似之間宜升麻湯及已發
結痂疔亦宜服解利之藥正患瘡疹并稟受怯弱者皆不宜用
之可用獨勝散荆芥散安斑散紅子湯快斑散如聖散調中散
犀角湯化毒湯紫草木通湯牛旁散紅綿散消毒散控心散奪
命散黃耆散皆可選而用之恐出太密者牛旁甘草散預解風
壅毒令不生瘡子者羌活散

○瘡疹出有逆順

瘡疹既出而有逆順者三有時之逆順在虛實之逆順有出入之逆順且春夏陽氣發生瘡疹出之為順秋冬陽氣伏藏瘡疹出之為逆此時之逆順也何謂虛實之逆順大小便秘而能食者此為實順也大小便利而不能食者此為虛逆也此虛實之逆順也何謂出入之逆順大抵瘡疹出者為順倒靨陷伏者為逆此出入之逆順也要之傷寒熱在表而不可下者恐裏虛不能作汗而解故也瘡疹發熱在表結膿痂必先得其裏實則外方不陷伏此簡易平直之理人之通論也又有稟氣弱而內重者因出瘡疹間大便自利懼其陷伏至於服薑附硫黃豆蔻鍾乳桂木等藥以助之至於平安者固有之又有內實皮厚肉密難出毒氣不得宣泄至於服大黃硫石龍膽乾葛大青梔子木通石膏服之至於平安者亦有之此皆臨用則隨時變通豈可執泥於一曲哉

○瘡疹出遲有數證

瘡疹出遲有數證不可不辨一者出紅斑於肌膚之中紅點生為血痘血痘生膿胞膿胞結痂死而方愈若紅點見至數日而反不出者此為毒氣復陷其證危也蓋小兒熱毒在內又遇冬溫或春夏暄暖內外皆熱鬱發腠理逆為瘡疹始者瘡疹出必先為紅點點當此之時或遇天氣大寒肌膚閉密毒氣反伏而不出則身涼內躁面青而煩或謔言妄語當此之際宜用解肌表出之藥如紫草散猴梨酒蓋斑毒未甚出也發散始活血散之類又有紅斑點方出於外或內蘊或食生冷或投涼劑宣瀉致令臟腑虛冷不食自利亦復陷而不出者宜用溫裏之藥蓋謂裏虛寒故也益黃散活血散參朮丸之類以溫之此紅斑既見不可復入者但宜溫出者一也二者瘡疹已見斑點斑點盡生成血痘者期七日而結膿疱今一半尚為斑點未全皆為血

痲此毒氣半出故也緣瘡疹遇冬溫或春月陽氣乍暄其熱毒
一時隨天氣運出於肌中當其未出則內外皆熱及其出也則
外盛而裏虛大抵五行四時寒暑則從漸而久非節氣之冬溫
而夏冷來暴而去速小兒為暴熱運行內熱出外天之暴熱一
退令兒外盛而裏虛則無陽以應瘡痘故出遲令半出半未
出也故半為斑點半為血痲當此必不能食乳大便如常小便
清白者宜用半溫裏半發表之藥如紫草蟬殼芍藥葡萄酒以
表之如活血散人齒散以溫之內虛甚者生寒寒則大便或溏
或瀉宜理中益黃豆蔻丁香之類以溫裏裏溫則氣不消削氣
不消削則不伏陷矣蓋胃腑為裏既得溫煖與肌膚相應血氣
溫深方能蒸出也三者瘡疹既出大盛而不出者尋之臟腑無
病榮衛自和無諸虛實寒熱為害但遲遲不結痲死而反盛血
片甚者至於內陷其瘡黑腐爛矣痛如刀割由毒氣入心悶亂

而危此由雜氣衝之房室觸犯故也故仲景云瘡疹未生之間
宜燒赤木猪甲以辟惡氣勿令外人入房恐六觸犯最宜防備
其中縱得安者亦必瘡痕經年黑色也及勞人力狃臭人薰觸
坐卧切忌當風寒愈而成瘡疹宜燒黑牛糞貼之貴速愈而無
瘡痕矣左右上下安胡荽酒以禦汗氣惡氣食葡萄以利小便
大凡患瘡疹常燒乳香最辟諸惡氣不可不知人之榮衛遇
香則行遇臭則止故惡氣不可不辟如物理相感木得桂而
枯雌黃遇胡粉而黑亦如之意前人既有所戒在後人不得不
遵之

○論諸熱失治變為瘡疹候

病有初同而後異有初異而後同者此乎物極則反勢使之變
也若不通而變之則似是而非若同而異迷而不反者有矣且
傷寒傷風傷食風熱皆是熱也須詳辨之且如手足指微冷而

青煩燥而惡寒左額有青紋者傷寒也面赤而鼻流清涕手足煩燥自汗惡風者傷風也眼胞腫而右額有青筋頭與肚俱熱胃滿不食腹脹者傷食也面青紅額正中有青紋手掌心有汗獨處不安特發驚怖手絡肚微動似驚惕此散熱也身熱而倍欲食唇紅面赤大小便秘脇下汗此風熱也土諸熱證則均究其所以熱則異且諸證皆熱也故人身無非常之熱亦無非常之冷但溫和而已今失於將理肌膚蘊熱蒸於一身蓋善醫者如此而汗如此而下隨證滲泄應手而愈若用藥遲速失序當溫反吐療熱以溫則變證百出蒸為瘡疹者多矣且前諸證皆熱也瘡疹亦熱也熱毒蘊於肌中失於治療皆可變為瘡疹故傷寒則有胃爛發斑小兒則有胃熱發斑冬溫則有溫毒發斑或初發熱則不同其蘊熱則同此乃後同而知異皆瘡疹證也夫知其始異不致於變成瘡疹者明矣不知其始異致其變成

瘡疹者敗矣

○瘡疹作搐

水流濕火就燥此勢之必至瘡疹本熱熱則動心此理之自然
夫心火熱而生肝風肝風旺而尅脾土脾土尅受於中則上下
氣不循環五行之氣無以相制則心火獨盛於上肺金受火尅
而無力不能制伏肝木熱則生風風火盛而脾土衰熱氣相擊
動於心神心喜為熱神氣不安故發驚也當此肝利小便風
定而斑疹隨出心臟斑脾臟疹濕肝則風去利小便則心熱退
矣風熱既定則驚搐亦自愈矣然者凡風火相勝而作搐不顧
瘡疹便用水銀朱砂黑錫腦子硝石諸般涼藥以治之使已出
者反陷伏則當出而不能出益瘡瘍煩燥痛癢皆出於心心熱
太過則搐古人治大熱則利小便熱雖甚不能蘊搐為驚搐之
害今心受熱投以寒涼損心胃藥以冷之則其氣飲何由而出

沈中焦既冷上焦熱愈不降其熱尤甚常見小兒患此誤投寒毒藥至死者臨終則遍身斑出以致不救蓋心一寒無緣發已
在表者命終氣散黑靨陷伏已無及矣要知但是治驚當平肝
去風利小便最為要妙况瘡疹在發驚之後何不謹防瘡疹之
敗耶又况治驚者專用涼毒藥使脾滯心氣不降尤為驚病大
害况後有瘡疹者乎

○瘡疹論疎利

龐安常云冬月溫煖小兒至春月必出瘡痘則冬月預服三豆
飲子以解利之千金論云人之初生便伏生地黄汁數規殼而
下黑糞則無瘡疹矣外臺方云時行暄暖便服油劑又云瘡疹
盛行恐相傳染煎茵陳根汁與服以解利之此皆防微杜漸見其
未兆間以疎利為良也何嘗拘於臨發熱時然後利之耶且如
用升麻湯是治已發未發皆可服夫未發之意其為未見斑點

已前可服之已發之意其為已結而死已後服今人咸稱方狀
云治已發未發皆可服之曾不知稟氣厚者則庶幾若受氣薄
者則為害不淺遂使遲速失度致於陷伏者多矣然則小兒稟
氣厚者能食唇紅頰赤渴水腫中謔語或時啼哭又遇天氣暄
熱易生瘡疹逐時以少藥疎利心肺使熱毒皆散縱有瘡疹亦
暄矣雖曰小兒純陽亦有稟受怯弱內無蘊熱雖天氣暄熱若
面青大小便如常無熱者則不可輕用解利藥恐反生他疾故
用解利藥者宜審察虛實可也蓋瘡疹屬血熱轉下屬殺氣今
言小兒發斑瘡此熱在裏而未發者斑毒未出則宜疎散熱毒
導引快利使無壅遏何嘗以轉下為法况疎利與轉下相去之
甚遠疎利者如三豆飲子油劑生地黃芍根紫草湯升麻之類
又何嘗在已發斑之後用也瘡疹雖有轉下之法非謂瘡疹而
轉下因生內熱使瘡疹毒氣內外蒸鬱恐生他疾方以疎導之

以平爲期因瘡疹外熱臟腑受熱內外皆熱遂令正患瘡疹之中大便秘裏急後重小便赤澀腹滿而喘渴飲水漿手掌心并腋下汗出譫言妄語能食而瘡痘不結痂疔此是胃中穀氣瘡疹熱毒蒸蘊亦熱至甚方可令大便調過一二次使表無壅遏之患而已轉下雖有內熱亦不可過利常因有內熱味者偶然大利使內壅痘疹必陷及爲深害不可不知故傷寒下之早爲結胃瘡疹下之早爲陷伏或有不問虛實寒熱見出不快便下之言瘡疹是熱毒壅殊不知瘡疹因熱而得出因虛寒不熱而陷如此爲害者甚多大抵治小兒純陽多熱毒固爲防瘡疹之患然身不熱斑未出已前內有熱證可下者則下之若已出斑瘡疎利在結疔之後二者迎合毒氣在臟腑則宜利之毒氣在肌膚則疎散非若瘡疹在肌膚反宜瀉腸胃之理又云總覺是瘡疹便宜利使出快此恐方宜不同用藥亦異若執之以爲用

則得失相半治疾用藥豈專在於補隅當隨證所宜斯為活法
矣

○論表出與溫裏不同

瘡疹因熱而生斑此皆因熱氣藏於腸胃故因內熱與外熱相
合隨榮衛運於肌膚則為瘡疹矣夫外熱者或感寒或感風風
熱驚熱皆感外邪而生熱苟失於治療邪氣盛則實實則生熱
故為外熱也既為瘡疹因熱而生斑因寒而陷伏蓋熱則出而
散寒則收而斂當此溫肌表散而已又有熱毒正盛因煩熱而
食生冷或服涼劑使胃寒則榮衛流注循行失度不能運化當
此溫裏最為宜也此則內外之感當隨證參泄或感風寒閉密
腠理而瘡疹不出或出紅點或血疱其肌膚青白而惡寒鼻流
清涕耳與陰皆熱宜與表散則可如惺惺正氣散活血散紅綿
散紫草湯之類是表散之藥也其內傷生冷或服涼藥過劑或

吐或利此為裏寒急宜溫裏以救之其人必大小便利腹痛不食或嘔此宜用理中丸益黃散五積散治中湯之類若醫者不明於此裏寒不能運出當溫之反發散外寒所伏不能出當表散而復下之是皆表裏不分寒溫失度當察其證

○諸瘡疽膚疹

臟腑不同表裏有異是以瘡疽與膚疹分淺深也腑屬陽有熱則易出是以名膚疹膚疹一出便如麻瘡細胞出於肌皮之上一出而便沒以言膚疹在肌其所受氣淺故易出也臟屬陰有熱則難出其為瘡疽在肌肉血脈間必先出紅斑而後生成如疽故名瘡疽其所受氣深是以難出也暴熱而便出者必膚疹久熱而難出者必瘡疽不可不知

○天氣煦熱即與踈轉後有瘡疹則輕既出不可驟利瘡疹所感而未成既成瘡疹而已出瘡疹出盡而結膿痂疔三

者邪正輕重表裏先後不同用藥亦異方書云純然者是瘡疹便
與疎轉即輕者大凡用藥之意是瘡疹便與疎轉蓋冬月究觀
天氣愷暖至春夏陽氣發生兩熱相合則生病或嬰孩或童子
內藏虛熱天氣愷暖即唇紅頰赤又渴飲水咳嗽痰盛胸中驚
悸此皆熱氣所作以意推之臟腑蘊熱春夏必發瘡疹以藥疎
利臟腑熱氣既去縱有瘡痘亦輕此冬時便當即解之今人不
然見紅斑已出熱毒在表復轉下之是表熱不除胃氣大虛無
以運行榮衛毒氣最伏久裏則多危斃矣但既成瘡疹而已出
是紅斑見時切不可疎轉其熱氣已在表故也既結膿疱者是
毒氣已出而未結痂尤恐毒氣再入臟腑餘毒為害却宜疎利
之則不生他疾矣以此觀之疎利在未發瘡子之前及已愈之
後不在瘡子正發此時利

○瘡疹已出諸證不一

等藥持影遂形動則隨之病有證藥有注用則寒之如虛補實
未嘗不愈也瀉盛而補實未嘗不危也瀉症本蘊熱毒於內
及其發也體熱則血脈鼓榮於外要在血氣溫深胃氣盛壯水
升火降然後熱不能伏歲隨血氣以流於肌絡結瘡瘡而出豈
一證可拘有胃虛不食而出或吐或瀉不食可見也則止溫之
有榮衛虛弱不能出者惡寒面青白肌膚軟慢似出不出者是
榮衛弱也當和其榮衛如活血散可也有已出彼風所感不能
出者或發熱或狂言或風搖或遍身青紫紋是也當發散如淫
淫散猛毒散有已出而服冷藥或食生冷而內寒沉伏不出者
則令瀉黑蘊潮熱啼哭或白色服脹口氣自閉四肢微厥如人
盡散理中湯可也有出甚被穢氣所薰觸則成血片燒乳香如
胡荽酒可也有慢服表藥過多遍身成一片謂之斑爛者宜安
養之如六神七珍散內補散雙和湯可也有正出盛服涼心藥

沉伏在裏發心寒戰慄伏者如丁香王冠薑桂當歸附子可也
有本虛少用藥大發之出得正盛忽然氣脫者此裏本虛也如
丹砂養氣理中益黃等可也有出毒氣彌盛內外通達無陰氣
所感但血壅滯結痂疔不成者七日已上楮尾膏證是也其
證各異宜細辨之

○論瘡疹熱毒所起之由

熱毒伏於臟腑則蒸於肌膚而成瘡疹非熱毒則不能出感感
四時非節之氣或感外寒相搏於榮衛邪氣盛則實實則生熱
因熱而成斑或傷食滯於中焦心氣不下隔熱而斑生或心熱
甚則生風風盛搐搦如驚癇而生斑是皆熱有所起之由其熱
至極動臟腑之熱而成瘡疹也則五臟各見一證且呵欠煩悶
肝熱也時發驚悸心熱也乍涼乍熱手足冷脾熱也而目顯頰
赤熱愛肺熱也腎居下焦不受穢無諸證但瘡黑者屬腎也良

由不謹風冷或因失肌內蘊毒氣伏陷歸腎則變黑色歷歷世
昔言瘡疹是熱此人之通稱也因熱而內外相蒸兩熱相合陽
毒歸外熱蒸而出昧者不察見瘡疹發熱諸證已見便与踈利
殊不知踈轉當時未覺為害後因瘡子出盛之時胃氣因踈而
致虛不能運出使人不覺是先踈轉為害則因內蘊為倒蘊為
不食為下利為昏倦變證百出不知所遇之初因踈轉為害而
瘡疹出運醫者不察當此又增發散更或下之愈增重因因此
又救之不善他疾必生殊不知傷寒因身熱而下早為結膏傷
寒身熱固不可下瘡疹毒氣已發在表尤不可踈轉固言小兒
因身熱耳冷尻冷咳嗽輒用利藥毒氣入裏則殺人因知傷寒
身熱為汗解瘡疹身熱為瘡疹為血泡為膿窠為痂死而方愈
則瘡疹又不宜利甚於傷寒身熱不可下無以異也其瘡疹有
宜利者在合下證詳論之矣大抵瘡疹是熱毒非熱則不能出

瘡子有大熱者當利其小便有小熱者當解毒是亦利其熱也
何必須轉利反虛其穀氣耶故知瘡疹是熱毒剋其熱則瘡疹
反不出為陷伏為害更深矣

○瘡疹已出不可服油劑

冬嚴寒而反溫小兒陽盛而陰微無陰以制之則熱停於膏肓
令兒頭髮豎直飲食以減此伏熱之兆便宜解之服油劑隨時
便服預以防之也如千金方論人之初生服生地黄汁一蜺殼
則不害瘡疹龐氏論冬月天氣溫暖小兒至春陽氣發生必發
瘡疹宜預服三豆飲子常論瘡疹未發服升麻葛根湯此皆未
見紅點時先服以防之豈是身熱斑生而用者且油劑三豆飲
子升麻湯是皆預用之或是冬月應寒而反熱名曰冬溫前人
推度之小兒純陽至春陽氣發生与伏熱相搏必作瘡疹故隨
冬溫時以服之又何嘗見斑點時服耶千金論人之初生服生

此黃汁數塊終身不患瘡疹此爲知錢尤防於未然者若斑點已出則不可服油劑矣

○瘡疹有發出者有溫出者有解毒者

病之在人所得有輕重善用藥者能使病重者即輕病輕者即安故仲景謂之隨證治世最爲活法且瘡疹身熱而煩燥喘滿脉促有諸瘡疹證不見斑點其熱未退者以麻黃等湯以發之若已出斑點者即止後服不爾再服此表發出之也或稟受虛寒脾胃怯弱或服冷藥至多傷於脾胃令兒手足逆冷脉息遲細大便澀而小便清者炮乾薑炙甘草湯互煎丁香參木藥可選而用之此溫裏使令自出也或瘡疹出後有餘毒者下利黃赤膿血身熱而渴當以薤白湯與解之於斯三者或發或溫或解祇審而之瘡疹可保無虞矣

○瘡疹雖有熱證大便如常過則不可再下

事物以中爲正臟腑以溫爲平故過熱大涼皆非所宜臟腑有熱者則大便數日不通熱蓄血聚壅遏不行勢必增劇不得已則下之若或誤下爲害不淺故大便如常是內無蓄熱切不可再下此前人言之諄後者蓋警策後人使無誤爾方書論五實證人能食而大便秘厥大皮熱無汗又有熱證相兼觀可下之又論五虛證令人不能食嘔吐皮寒脈細六小便利則宜補之以此而觀臟腑既已過如常則知裏無毒熱若下之者豈不爲重害者乎大便既如常有熱證者但利其小便則雖熱亦不熱爲害矣常觀病者大便不濡瀉有虛證用溫藥而愈者有矣大便濡瀉又用下藥而愈者未知聞也雖或有之是食積或冷熱不和互相爲害但半補半利去其食積分其冷熱此非正下者也

○不可妄發妄下

一物具一性一性有一用藥之性或補或瀉或表或下或散或
飲既各不同若然以所性施之所用用之當則遂時而病愈以錢
氏論發散轉下皆稱不可妄者恐其用之不當爾且瘡疹諸證
俱見及斑點既生若無內外寒熱虛實者但安養之待其所蘊
多少任其自然則無大過不交之患如此非為當時不生他證
亦病後易於將理今人則不然絕瘡疹斑點方出不顧所蘊輕
重多寡心速而惟恐不出故用藥表曳出之服以紫草蟬退副
以人齒猴梨併與酒麪羌萎無所不試曾不知毒氣遇藥發之
則一為十十為百百為千千為萬一之變合為一瘡方書稱名
斑爛至於五內七竅皆有則重者為之下救輕者為聲啞為目
疾為斑爛為閉耳塞鼻之患又有用表藥過多瘡表則盛裏無
陽氣以應之為虛脫者多矣以安表者之過也大抵瘡疹已出
者賴熱氣連其毒氣以出出則無眩冒壅悶之苦善攻其熱者

熱甚則利其小便熱輕則解其毒得寬矣脉理者不知但言瘡
疹是熱無時進凉劑致於胃氣虛羸令兒胃脘腹脹又且下之
致內虛毒氣入裏則殺人其衆此不善下之過也錢氏稱不可
妄發妄下誠不誣矣要之治熱以溫涼而行之未至於冷治寒
以溫未至於熱當從其漸而已合下合發合有其證則論又詳
具矣

○發熱有時則應臟腑知其斑瘡痘水疱膿疱

谷空而響者形動而影隨舉此而得彼也故錢氏云熱應時而
出是見熱而知臟腑明矣且以一日而觀之寅卯辰時熱者屬
肝為水疱巳午未熱者屬心為斑子丑寅熱者脾疹也耳腎不
受穢無證但出瘡疹變黑為腎申酉戌時熱者屬肺為膿疱觀
其熱發有時亦知瘡疹之所本是亦即前錄後之先見也

○蘊熱而斑毒

人之將理失之於微積微成損積損成衰故外厚三尺非一日之
難熱而斑毒非一日之熱皆積微成著也大抵小兒自然陽盛
而陰微況朝夕飲啖熱乳兼重衣溫厚幃帳週密則傷皮膚害
血脈痧癘發黃是生多疾此蘊熱而斑毒者表裏皆受熱也宜
預服升麻湯消毒散紫草湯油劑為良又有傷寒欲斑為感寒
毒失於解利邪氣盛則實實則熱熱毒而斑生遍身如被蚊蚤
所嚙不作瘡胞起但赤斑點者此五死一生之證作黑點者九
死一生之證名曰發斑非瘡痘之比皆稱曰斑故因而及之瘡
痘有數證疹起如痧瘡隨出隨愈此名痧疹其毒輕瘡痘如豆
水疱如喉而青小膿疱有膿而大其形各異又有心斑脾疹五
臟各有所主不可不知

○瘡痘已出未能勻

人之平居樂逸則心神安靜氣體和平及其病則陰陽偏勝盛

養雖不同故今虛實不齊是以瘡疹已出不能遍身前人治法透肌解毒而已使毒得出肌透消解氣既無壅遏則自然出也用小勝散快毒丹令其快然草飲胡荽酒紅粉丹自然勻順之

○瘡子未發者令內消

前人於瘡疹防微杜漸無不盡其意焉見小兒遇天氣溫熱或冬溫恐散瘡疹遂以犀角玳瑁二味磨汁與服之以茜草煎汁與消之則未發者令內消已發者亦能解利使毒氣不致太盛或有伏熱瘡疹未出四肢微熱飲食似減頭髮乾立或時額多微熱宜服生油方最佳

○瘡疹發熱而痛者

瘡為虛痛為實又云諸寒為痛又云內快而外痛者為外實內虛外快而內痛者為內實外虛是以聖惠方云痛者言其通也

則痛爲實可知矣。今疹出而疹是時行寒熱所感未能解也。故用麻黃湯水解散以解肌汗出寒熱自已。瘡疹亦無阻矣。

○瘡疹出不快

病之始末不同深淺各異瘡疹之出不快者非一端用之當隨宜而已。且瘡疹紅斑點出日數未盡其內實而肌熱者宜疎利有裏自利者宜溫裏斑點見齊血疱結起遲者實熱火小便秘渴而腹脹者宜勻氣解毒甚熱者宜利小便虛而自利者宜溫裏調榮衛益血。痘出甚亦令小兒內虛故也。自血疱作膿疱膿痘不結痂死者當此毒氣已出在表但解餘毒而已。故出遲者同出遲先後之序不同醫者當辨毒氣在表在裏若虛若實補隨調解隨證治之。此是正瘡疹證無諸內外邪氣所感者也。若患瘡疹中說有所感冒則治療不同。且患瘡疹正出遇時令寒暑燥濕風不節則麻證與平常異用藥不同。尤當消息且

正惡瘡疹中暑氣大作則或煩燥而咽痛或喘滿而作渴此乃暑氣與瘡疹表裏熱氣併遏壅滯而出不快宜與白虎湯荆芥散如出瘡疹中遇天氣暴寒令兒膚展秘密寒氣結聚出不快者宜用麻黃正氣散之類又有瘡疹止出煩燥飲冷過多或誤服涼藥使胃冷無以運行榮衛致中滿則上下氣不升降出不快者宜用理中湯薑黃散活血散至於下利者疏附豆蔻之類皆可選而用之文有瘡出正盛內外熱氣壅遏血蓄結聚令兒能食腹脹不大便煩燥而渴手掌裏有汗端滿出不快者此由毒氣與心火貫注無陰氣以飲之宜用乳香豬血膏紫金散猪尾膏以飲之或瘡疹止出被惡衝傷房室觸犯禁忌或孤臭人勞力人氣觸着令出不快者宜燒猪甲赤木乳香常燒令氣不絕仍止下安胡荽酒以禦之是以畧舉其數證方書但云出不快而已皆在人所得之由變通若大小便秘氣壅遏而出不快

紫草木通散是瘡疹發而不出者釣藤紫草散氣盡出而不快
消召散取銀屑散也氣虛者以我滋散活血散調聖者以紫金
散如聖散開花羅勒煎汁與服之婢退耳草散猪血乳香丸猪
血麝香丸木犀飲紫草膏瘡疹已出熱滯喉舌生瘡懊悶氣喘
煩渴多睡精神昏塞者以透肌散主之伏熱在胃腹脹便秘赤者
四聖散瘡疹不出傷寒不語乾野人糞散瘟毒既發痘瘡不出
者地黃豆豉散

○瘡疹面青者逆

素問云內藏心肺舌色彰明大九病在臟腑其證皆見於外所
以瘡疹病而煩燥面赤者心也面黃體倦者脾也面青多怒者
肝也喘噎面浮而白者肺也面黑善恐欠耳聾手足厥者腎也
此五臟有五色常与寸口尺內相應其不相應者病也又曰色
之与脉當參相應其不相應者病今瘡疹屬心令人身熱煩燥
驚悸面赤皆屬於心其赤者順今面色青是色不与病相應爲

不順也當更察外證防備之故素問云色以應日脉以應月今
瘡疹臨時觀之豈不以色應日也瘡疹當唇紅頰赤而反青色
其為病實者必生風大小便秘而燥渴者實也虛者必下利不
食四肢厥者虛也各宜用藥預制之

○瘡疹身熱而脉反遲

脉數為熱脉遲為寒此最驗也數熱屬肺遲寒屬臟今瘡疹在
表屬肺而外發熱脉反遲而屬臟而為寒是脉不應其病陽病
而得陰脉也宜當溫之以活血散當歸散之類臟寒下利脉遲
者以甘草乾薑湯豆乳散之類蓋得胃氣既溫榮衛以和則或
汗或疹而解矣其脉遲者是胃氣虛冷榮衛不足故也

○瘡疹非微痺則表不解

用若之法貴簡而當則病重者輕而危者安且瘡疹證雖極久
熱然發斑之際必因天氣暄暖或感風寒而發熱或驚熱或傷

食而熱因熱而生斑疹斑未出者方其初發熱得微汗散之後雖為斑疹亦輕也由非微汗則表不解也其證令人身熱頭暈鼻中壅塞咽喉不利咳嗽目赤也焦皮膚緊而脈數此皆熱極為瘡痘雖順而出毒氣亦不輕議者始以微汗解散其毒漸輕矣如水羊痘按心散麻黃湯等主之如斑點已出則謹不可用此發蓋自然出快則不可表表之成斑爛又有又發散隨汗為白珠子或出小紅瘡亦以汗而毒氣隨散不可不知也

○瘡疹既出不盡透透而不長血疱

瘡疹既出隱隱在肌膚不盡出透蓋透而不長血疱此皆脾胃虛榮衛怯弱使然也良由一時被天氣暄暖諸暴熱壅而成斑點斑點既出無陽氣以應之故今在肌膚隱隱而不出也當此則先和脾胃以行榮衛榮衛既暖毒無所容則出矣故前人用人齒散活血散皆暖榮衛以發之發之斑未出者用乳香猪心

血丸出而不盡透者以猪血麝香金手足心唇上最為要妙或以紫草散之類并脫殼散皆隨寒熱虛實而投之又有當出被外風寒所逼而不能出者其人必鼻流清涕頭痛宜以鮮利藥隨證溫散也又有被風寒所迫而不能出其人必鼻流清涕頭痛發熱宜以麻黃湯鮮利之

○未出可下已下出已定當利其大小便

毒氣在裏瘡疹未出者可下毒氣在表瘡疹見斑點已出者不可下如已出定結膿窠尚有熱證見者當利大小便此消恐裏有餘毒不盡因而生疾其大小腸主出而不納有餘毒可利之前人一動一靜必有至理存焉

○發瘡疹有微盛

是瘡疹證而熱數日瘡疹不出進退皆難成可慮也便欲大發之懼其瘡本稀而成斑爛或倒靨不發之人無以散毒熱故方

善論始以微發之微發之而不出即加藥加藥不出則大發之大發之後或出不多或無斑疹脈息和平無地證者即瘡疹本稀不可更發也以此思之皆是用藥有漸發散不至太過能不至不及亦用藥之善也

○瘡疹熱在表不可疎轉

毒氣在表宜散在裏宜下此為不易之法也今瘡痘熱在表却用疎轉其裏是表裏不分是故前人於一言一字無不審之其在表宜散在裏宜下其瘡疹是熱毒在表每每晏下壓其裏則至於天傷久矣殊不知傷寒身熱在表者不可下故活人書論瘡疹身熱耳冷尻冷咳嗽輒用利藥即毒氣入裏殺人尤甚刀以瘡疹固有下者自有可下證別具其詳矣

○瘡疹出太盛

瘡疹出太盛而面黃大便黑色煩喘燥渴或腹脹此為有於血

在裏故也宜以犀角地黄湯及治瘡疹中鼻衄吐血毒氣未盡有餘瘀血皆可服之然出得太盛燥渴者服甘草散其未出者亦可服之煩喘甚者以麻黃湯咽痛而嗽者入麝香服之尤妙出遲者與紫草飲子為良

○傷寒與瘡疹同異

傷寒男體面黃女面赤增寒各口中氣熱呵欠煩悶項急也瘡疹則顯赤燥多噴嚏悸動昏倦四肢冷傷寒當散瘡疹當溫平勻氣面赤顯赤之不同又有諸熱證蒸為瘡瘡雖始終各異當隨證而治之不可泥於一曲

○未能辨認間服升麻湯已發未發用胡荽酒

善治病者期於未然不善治者治已然昔人論升麻湯未能辨認間可服之是瘡疹未發未見斑點之前可以內消所以服之若已發見斑點者不可服蓋升麻湯性大寒故也已發而服升

麻湯是以出齊結痂死之後方服解餘毒也往往人未知此則
斑點既出而後服之令肌涼而反不得出爲害極多用胡荽酒
則曰已發未發皆可服之胡荽碎一切惡氣衝觸外護之用胡
荽者酒酒胡荽於床帳左右上下安之可辟惡氣瘡疹正宜用
之非升麻湯之比故知升麻湯未辨認間服之能消諸蘊熱而
解毒於未然及其斑已見則當以和平藥安養之升麻葛根性
大寒瘡疹既出而服之則反使寒弱爲出遲爲寒中爲陷伏小
兒稟受實者瘡發或所稟怯弱者最爲大害不可不知故方書
有直言瘡疹言不可下者有直人之稟受不同方宜又異豈可執於
一偏而不知變且北方冬月則風寒水烈南方除夜天氣溫和花
卉亦發萬物亦應時豐四季皆無毒熱酷寒之害以此觀之所
稟既異所治亦殊在臨時隨宜而用之不可下與可下自有證
候故執泥者乃醫之病矣

○張氏論瘡疹氣勾即出快

難經云氣行則血行氣止則血止故氣主呵之血主濡之濡軟也氣行即血隨而行之氣滯則血壅之故張氏論瘡疹氣勾即出快蓋臟腑既有蘊毒方其壅於肌膚熱喜散而出爲瘡疹熱亦不能復還榮衛週流血氣流注則出而無阻蓋氣勾即出快此其義也或有結搏或裏有食滯於中焦不化或外寒所感皆今壅遏不通故氣既滯則血不流何由而出當此不能審察之則至危斃者有矣能使氣勾行而不滯瘡疹無不出者

○瘡疹血疱作成膿疱今人心膈煩燥不安

瘡疹之發有漸當審次序可也若先後失序輕重失時歛散不得其宜則必凡差悞矣夫斑瘡疹始作而未出者當疎利令輕也既出而成血疱當令榮衛升降調脾胃令不冷不熱及其將作膿毒氣正盛大腸不通者潤以通之大便自利者溫而固之

小便不通者導之及其亦結則解散其毒此治之大體也且瘡
毒作膿是血疱結造也心者主瘡瘍主煩燥當其作膿毒氣已
出未得靜盡則毒氣應心而煩燥生矣若血疱作而煩燥此熱
毒欲散未散之際但解熱毒而已宜用豆湯解之以黑豆煎汁
放溫徐徐與飲之

○瘡疹身熱耳尖脚稍冷腹內痛或現

病有似是而非若同而異者蓋肢體冷而腹痛者此毒氣在裏
若不能審諦必作極冷治之反以熱藥為害愈深未冷極者不
問身有無寒熱肢冷腹痛必大便自利倦卧惡寒今身熱肢冷
腹痛大便不通蓋熱毒在裏則熱甚而發厥伏熱深而瘡疹不
脹出者宜以蟬脫末水煎服之而已出者亦可服之無害毒氣
得泄則四肢溫暖腹痛自止矣前人論腹痛有虛有實腸鳴自
利而腹痛者為虛痛是冷也腹滿而不大便秘者為實痛是熱

也今腹中痛而不大便又身熱耳尖冷却冷為瘡疹證明矣又有瘡疹始發腹中有塊而痛醫者不能詳辨多作食積下之至於大橫者多矣

○愛護將理

小兒鼻塞摩頰以通之榮衛不和洗浴以通之腠理空陳粉未以蜜之此皆外可以通肌也及其瘡疹既作血肉作膿茄肌嫩未實諸氣可通恐惡氣有所觸犯而入故制方論使愛護而為防備計故云已出未出切忌見雜氣衝觸兼勞入又孤吳人彙之尤忌勞勞人相近未愈者不可當風生卧如當風即成疥癬也若瘡疹膿胞出可澆牛糞灰貼之則速愈而無癢痕也及左右上下不可缺胡荽酒能禦汗氣惡氣也若能食者時與蒲萄食之為其能利小便及取出快如穗之義若斑爛膿腐甚者以乾淨黃土細羅以傳之仍數數食蜜若勢輕者則以芒硝和猪

膽調金瘡上勿令動着直候瘡如落也有大段瘡發不通臥席者以麥楚簾卧將息不問已發未發皆可燒乳香於房室中令氣味不絕辟一切惡氣

○手足冷腹中硬為瘡疹

臟腑已有伏熱而感外風寒以擊之此陰陽相搏於榮衛輕者在腑為疹重者在臟為瘡痘若手足稍冷尻陰冷腹中硬痛者是瘡疹證或有驚證者由蘊熱動心切不可誤投驚藥若驚藥誤投則毒邪內攻其瘡不出便至危殆或出後為鰐倒但服平和勻氣發散藥必愈

○聖惠方論瘡疹未見乃可疎利

凡嬰童患瘡疹候初覺似傷寒面色與四肢俱赤壯熱頭疼腰背痛足多厥冷眼精或黃或赤脉息但多洪數絕大不定小便赤而大便多秘總覺四肢色候雖是瘡疹未攻皮毛穴出者可

便服餅勻和臟肝疎利毒氣若瘡疹已結在皮毛穴間微微自出即不可疎利也或寶臘水者却可疎利也蓋熱毒已在外恐裏有餘未解則可疎利也疎利宜黃連散青黛散當歸散

○石壁經論瘡疹歌備詳其證

小兒瘡疹候偏多咳嗽痰涎作久疳熱候心神如怕物驚時羊眼白翻波認目看燈睛有焰吐來氣逆又相磨十歲妄中如發檣唇紅臉赤疎交羅湯水心煩頭滿熱耳冷脚冷發無過舌上有如粟米樣定知三日發交瘡此病未來宜早療莫將涼藥與伊摩細辨形證為妙用尺將平藥以調和

○辨劉氏論轉下張氏論用藥

劉氏云初虞世所著必用方大有益於世惟瘡疹云當轉下誤入甚多緣方宜不同所稟虛實有異故也蓋小兒瘡疹轉瀉則助虛毒氣不能運出復致於裏陷伏多致大傷張氏論用藥瘡

疹服惺惺散次服人參羌活散等如壯熱未退切不可通利大便及溫熱藥恐令疹不出二人之論與初虞世之論皆未可熱須在臨時可溫則溫可下則下皆有可溫可下證別具詳之矣學者宜通變用之可也

論痘疹已出證第二

○瘡疹熱與諸般熱不同

發熱證候多般瘡疹亦發熱也其體熱則同所得之由不同須引證而辨明之則各異發熱如瘡狀熱作有時者名潮熱發熱飲食不減者名風熱發熱而頭熱肚熱右額有紋者名食熱發熱而多渴渴則瀉者名疳熱發熱唇上下汗出唇中間起一白疱子及耳陰皆冷者名變蒸發熱而額正中髮際有青紋下至眉心則發驚者名驚熱發熱而皮膚或赤色熱痛時時啼叫者名丹熱發熱目閉面赤色者名胎熱發熱而面赤汗出而鼻衄

消涕左額有青筋文者名傷風熱發熱而面色青慘耳鼻冷惡寒無汗亦左額有青筋手足厥冷者此名傷寒熱也又有發熱之中偶有時行寒疫者則耳與陰反熱若瘡疹發熱則不同然呵欠頻悶時發驚悸乍涼乍熱手足時冷面目頰頰赤軟實者此皆瘡疹之熱證也

○瘡疹出視輕重

病首輕重藥有淺深病深藥淺不能去病病淺藥深真氣受弊觀瘡疹分輕重而治之其瘡疹出稀者輕裏外肥紅者輕外黑裏白者輕瘡夾疹者半輕半重也一發而出盡者重也外黑而裏赤者微重外白而裏黑太重也青乾勞肺昏睡汁出不止煩燥熱渴腹脹喘喘大小便不通者困也瘡中端大小如針孔者緊劇也論輕重爲用藥之法輕者宜目氣令其自出也半輕半重宜解毒毒散則自輕也毒氣重者宜利小便太重而勢劇者

醫隨正滲泄熱氣衝於心則譫言妄語則硃砂參苓之類可用
心熱於肝則搐搦狀若驚癇則防風羌活天麻全蝎兩星之類
可用也熱於脾則腹脹渴水大便秘目腫則枳殼散橘麴山柈
地黃之類可用也熱於肺則喘急渴水咳嗽鼻乾則桑白皮馬
兜今半夏之類皆可用毒氣歸腎而黑麝入者宜猪尾膏活
血散皆可急而用之也又有風邪客搏於皮膚熱不得泄瘡變
為癰疹之狀皮膚癢癢者則輕又有內先蘊熱外被風邪相連
搏於血則赤斑其毒亦深傷寒變瘡痘者其傷寒熱毒甚而發
炮瘡其瘡色白或赤發於皮膚頭作癰漿戴白膿者輕有紫黑
作根隱隱在肌肉裏者其毒必甚重者五內七竅皆有瘡其形
發如豆故以名焉大抵正瘡痘是母腹中時受積穢良田內實
而斑毒生其感風感寒為癰疹為梅毒為痘瘡皆外邪乘內虛
而伏於臟腑內外皆熱熱蓄血聚壅遏不行緼結而成也所遇

之初不同可不辨之正發字內實而生者五臟各有一證前篇
備論之矣且傷寒傷風何以別之面青四肢微厥無汗而惡寒
耳與陰皆熱者傷寒也傷風者面赤四肢煩鼻流涕有汗惡風
此二者宜審而早治之不爾爲瘡疹也若在母腹中蘊毒氣者
千金方云兒初生以生地黃汁一蜺殼與服便黑糞爲解又瘡
疹臨發未出之間以升麻湯解之冬溫以三豆飲子解之時氣
發瘡疹恐相傳染以茜草根煎汁解之此皆瘡痘當用者惟傷
寒傷風變爲瘡痘是汗下失時之過

○瘡疹疎利與取轉不同

瘡疹已出熱毒居表而不可疎利疎利是未出時即疎利之疎
則散其熱氣利則滑其肌竅使熱毒則發泄而不蘊遏其瘡疹
輕而易出也及其瘡疹已出即不可疎利宜以和平之氣藥調
理爲宜又局常令人以轉即且疎利與取轉相去遼遠疎利者

是以輕涼之藥疎泄便易出也如黃連散青黛散當歸散煩燥
轉卧不安煩煎豆湯徐徐服之取轉者是以峻快之藥轉下也
如巴豆芒硝輕粉水銀之類是也疎利與取轉輕重殊等不可
同日而語古言疎利今乃為取轉得不為誤耶

○辨薑朮指迷方論與錢氏活人書不同

小兒所稟有盛有實病証有寒有溫故良工隨宜而治各得其
所今觀薑朮與指迷方論其稟氣厚者或病熱而又失於解利
有蘊積熱毒者治法則當利利之無不愈此由小兒稟氣已厚
又有病熱而失於解利蘊熱在裏則宜利之利之無不愈矣此
薑朮指迷用藥之意皆熱毒未出於表蘊毒在裏時用之也若
無錢氏方活人書用藥之意錢氏論倒瀝欲脾強而勝腎得身
溫而渴陽氣復者可生也活人書云身熱耳冷尻冷輒用利藥
則殺人二人之論身熱為瘡疹毒必在表氣虛在裏故不可利

但以溫平解毒而已故知傷寒身熱而下之早毒氣入裏為結
胃瘡疹為熱在表下之早為黑靨為陷伏四人之論皆不可廢
用之要得其宜後之醫者當以董汲指迷方治瘡疹未出預截
熱毒若已出了者解利餘毒則無不愈矣以錢氏朱氏之意治
瘡疹正作使外不至太過裏不至陷伏亦無不愈者大抵治疹
皆當隨宜用之最為要法譬如小兒患有傷於冷者有伏熱者
有被驚者有感風寒者有傷食者臨期分別豈可泥於一曲況
習醫者又隨方而用之以愚觀之昧者徒五見其偏審之四說
皆為可用

○治瘡疹方宜不同用藥亦異

素問云「病見用藥各不同皆愈者何也」此地勢使然爾且東
方食魚而嗜醢令人黑色而踈理為病癰瘍以砭石治之西方
風土剛強外邪不能傷其病生於裏治之宜於毒藥此方風寒

水烈藏生寒滿病其治宜於四熱南方天地所長陽盛處其下
水土弱而霧露之所聚其民酸而食附病而擊痺治以微鹹
中央地平以溫其生萬物也衆雜食而不勞病爲痿厥寒熱其
治宜於導引按蹻是以五方地勢高下不同治法亦異故仲景
治傷寒用桂枝麻黃大青龍湯皆是熱性藥云西北二方行之
無不應驗惟江淮地處暖用加減法如升麻石膏知母之類是
隨此五方地氣而用藥也又云病素有虛實者並用古方不在
加減法當此隨時變通不泥可於一曲且西方風土剛強外邪
不能襲病生於裏其治宜毒藥利之設有陰證者亦須用理中
湯四逆湯之類以復陽氣南方雖爲陽精拱上其地下水土弱
霧露之所聚病爲擊痺設有陽證者即用大黃大青黃連葶藶
苦酒之類以復陰氣也此皆前人得隨時增減之理則知癆瘵
豈在專補專瀉但應當日脉正祛逐可也方宜各自不同故用

藥豈可執泥哉

○瘡疹戒失不可當冷

人之飲食起居有消息虛實存而且晝日起居行坐其氣血漸降也夜則倒眠血氣漸升則心安而逸也此上下升降虛實運動也且人之膏腹方其飢也則腸實而胃虛及其飽也則胃實而腸虛此平居飲食進而無病尚且一起居一飲食而一虛一實存焉况小兒在母腹中所蘊穢毒在臟腑欲出為裏熱熱甚而發於外其熱暴出其裏虛正賴飲食湯藥以助之苟或失飢內無食以助胃何以運出其瘡痘則為黑靨陷伏者多矣此內虛所致也故不可失飢者此也又瘡疹正出乃表實裏虛心煩惡熱而欲冷或起居當風或失蓋覆則虛熱被外風寒所搏而為陷伏者亦多此外邪所致棉瘡疹者可不謹歟

○瘡疹有大熱者當利小便有小熱者當解毒

論人論瘡疹有大熱則當利其小便蓋大熱則更熱肺實大小便皆不利心熱而渴氣滯而喘脹食不結膿血瘀死當此裏熱既盛俱其生他疾故利小便心火有所導引雖不用冷藥熱亦自減去矣可待其瘡疹至熱過不為冷誤尤為良法其小熱則解毒蓋小熱不解大熱必生小熱而利小便則損氣當此有小熱不可利小便但解熱而已如玳瑁湯獨勝散安斑散如聖散紫草湯犀角飲此雖不利其小便其熱亦不能為害當思前人云大熱者方利其小便有小熱者尚不敢利其小便恐致損氣彼其變下者可不愧乎

○小便赤澁心腹脹滿

因瘡疹伏熱在胃則中有所隔上則心火不降故小便赤下則陰氣不能升故為心腹脹滿蓋氏紫草散發出其毒胃中熱散自然冰釋詳其藥味以紫草發散以黃耆定痛解毒生肌以枳

鼓治腹脹令大腸不秘氣通消脹以木通導心熱而利小便以甘草和之古人用藥必有至理焉可不以意推之

○先曾利而後瘡疹出不可再利但解毒而已

飲食芳味雖能益人用之過亦能害人况烈毒慄悍之藥又在已下之後豈可再利之此五臟不可再傷故也蓋瘡疹未出已曾先利之今瘡疹始出則內無壅滯熱毒縱有亦已輕矣故云曾經下後惟有熱者瘕幾矣其熱亦瘕幾矣大抵瘡疹不經下亦有內壅者宜勻氣安養之又况曾下而後瘡疹出若又下之是重壅也

○煩燥而渴

心經有熱則煩燥脾臟津液少必口渴咽乾而渴也瘡疹已出未出皆宜用甘草散若心煩發渴大便不通小便赤澀者宜服通關散煩而喘悶心湯主之夏月天氣大熱夾暑煩燥熱渴

大便秘而小便赤者白虎湯加人參煎服之虛煩發燥而渴小便不利者五苓散酒蒸黃連九皆要藥也宜擇而用之

○瘡疹煩燥腫卧不安者

陽氣勝而陰氣少則煩而燥甚則其心悸動不能安矣故身熱煩燥腫卧不安但清心利小便則自然安適若表不解身熱而煩燥腫卧不安者服水解散或結糞大便秘而煩燥不得眠者必腹脹手掌心腋下汗宜服麻仁丸或煎黑豆徐徐飲之甚者青黛散以水調服惟津液枯少虛煩之氣晝夜不得眠者酸棗仁湯為良也

○瘡疹斑毒狀如蚊蚤所咬毒盛而黑色者

瘡疹陷伏虛實不同宜詳辨之有胃寒榮衛氣虛而陷伏者則肌膚慢瘡面皆白不欲食或嘔大便不秘小便清白者此皆宜溫之活血散人參散胃愛散虛寒甚而至於自利間亦可用雞

附子理中豆蔻亦可用瘡出爲期又有毒氣內外壅遏熱蓄結
聚而不散毒氣壅聚於肌膚急出不得壅於毒氣倒靨黑色蓋
血活如朱砂如鷄冠色若毒聚血聚則黑色又如蚊蚤所咬而
黑色者由毒氣暴出熱搏之故血凝而不得出爲黑靨其證
最惡其大小便秘腹脹滿喘急煩燥者宜用山梔子湯宣毒膏
治黑瘡子患候無比散毒氣內攻紫黑色出不快者莊氏云斑
瘡倒靨帶黑色者謂之兕瘡子宜獾猪尾血調腦子佳

○畏服涼藥水伏瘡疹者服胃愛散

小兒胃熱出斑瘡蓋胃者主一身肌肉其胃中熱則身熱身熱
大甚斑毒得出胃熱既出其裏已虛合以和平藥調助之又有
疹及病家未明乎此見其熱便用涼藥是裏無熱又加冷藥
則藥稍寒使瘡子不能出也蓋有熱則氣散有寒則氣歛使肌
膚急而腠理秘固瘡子輕者爲出遲重者爲倒靨可用胃愛散

以溫之胃氣既復得溫榮衛復行則出矣故胃受散以脾胃虛生寒而用之

○瘡子便血糞黑腫不醒者

瘡子當出而不出者此由毒氣當散而不散也蓋心主血而營於血瘡疹不出毒氣壅聚於裏則為便血黑色故神昏腫而不醒其證甚惡脫殼散犀角地黃湯主之

○瘡疹已出而腹脹

瘡疹已出而腹脹者何此陰陽不和也此毒氣陷伏入裏也二者緣毒氣已出而未盡又正熱或外傷寒而內傷於冷也大抵瘡毒正作熱毒蘊積則多渴煩燥而引飲又或投涼藥或飲冷水故熱被冷激而不能蒸出冷氣內拒而不能消化其於熱表氣相搏於裏則不消令人腹脹氣喘甚者發寒肢厥瘡瘰白而無血色或至不救急宜以溫中藥逐冷氣冷氣散則腹脹亦消

時者一見腹脹莫不更增宜瀉是謂重困蓋傷於冷者必不能食大小便利時時下氣此傷於陰陽氣不和也又有毒氣陷伏入裏者瘡疹出遲毒氣倒靨亦令兒腹脹亦宜用溫平解毒快氣藥如人蔞散活血散之類服之大概毒氣伏入者必有熱證相雜或渴或煩燥或大小便秘澀或啼哭不止者則陷伏黑靨證中具詳矣若腹脹目閉口中如爛肉臭者其證惡此為難治

○當下當救裏

瘡子半出半不出此毒氣半在裏而不出盡故也或盛出大便秘不通小便赤澀喘麤腹脹而齒唇乾口燥引飲語者當急下之此由毒氣彌盛而內外皆熱若大便裏急後重者當令大便潤過內不燥不裏急後重腹不脹者且利其小便又有瘡子半出半不出下利四肢厥逆腹脹吃噎此由裏寒毒氣不能出故宜以薑附理中等藥急溫之一則言當下者恐毒氣復入故也

一則言宜溫者恐無胃陽以行榮衛虛實之勢劇也故二者皆不可廢

○瘡疹既下懼太早

天病有遲速藥當隨應而用可以速則速可以緩則緩如響應梓間不容擲且瘡疹始出未有可下證但以和平藥調理之乳食飽哺之避風寒以溫之三者皆為保子之常法如瘡疹見而三五日尚未出者可微發之微發不出則大發之大發之出不多脉息平和無他證者即瘡本稀不可更表散也今人總見表不出熱又不退必便下之其內虛瘡子將發者則因利而不出瘡子已出者必復陷陷必黑靨瘡子歸腎此為脾土弱而腎水反勝錢氏以百祥丸下膀胱毒則脾土自實瘡痘可以復出與其下膀胱毒於黑靨之後莫若正脾土於未出之先則不下為愈是風與熱證皆可下今見熱而便下故不可也況下之縱愈

亦有三證一為疥癬二為痘麻三為目赤有此證者皆下之失
於早不可不戒故前人論曰瘡疹未見乃可疎利是熱毒未形
容間毒在臟腑則預下之也又黃牛升證云瘡疹出定大便不
通今膿汁不乾者可下之以此觀之當下證是未出之前及已
出定之後非正出而可下也且利毒丸雖治胃熱瘡疹欲出混
狂腹脹氣壅大小便赤澀煩渴舌乾腫中驚而脈沉太滑數
雖名利毒丸利其邪熱晚用大黃大黃性利毒解表故傷寒當
利亦用之又通關散證云治患瘡疹心燥發渴便赤口舌生瘡
用水通瞿麥滑石皆利小便藥也二方皆謂大小便熱為害甚
則去其熱毒氣苟不用之又為失下之害故用之豈是瘡疹正
出而下之也故下之者不可太早

○誤下證

陽寒身熱固不可下瘡疹熱不在表尤不可轉下者蓋熱毒已

在表故也活人書云小兒身熱耳冷尻冷咳嗽輒用利藥必毒氣入裏則殺人蓋熱在表則表實而裏虛故身雖熱裏無可下證而便下之則裏無陽以應表至於陷伏而死者多矣如抵牾赤血氣順脾胃溫則易發若裏無熱而誤於疎轉則令氣弱血虛脾冷榮衛無以運化而毒氣難泄立見危殆尤當審諦又况小兒鼻塞唇焦內伏熱也脉細面色痿黃或青色皮膚又慢口吐青涎者此誤下證也或服涼藥太過或裏無熱壅滯則不可下也

論瘡痘已出後復生他疾第三

○論瘡疹當令大便過者有當溫者有當令下者

夫瘡疹傷寒風熱傷食諸證身有熱者如大便四五日或六七日不通者須用少藥令潤過非取峻快之意亦有外證參之須子細辨認為宜如仲景云腸結陰結大便秘者至十四日十七

日方劇苟若至十四日十七日因有他病損耗津液而無結糞
腹不脹不裏急後重則不可攻之蓋腸無結糞故也今言六七
日令潤過氣升降則身熱者不生他疾緣小兒純陽身熱而大
便不通者易實大便自利者易虛易生他疾當調令大便如常
最為候臟腑虛實之要法也雖然大便秘非一證有風秘有氣
秘有熱秘虛秘冷秘用藥當細辨也且人能食大便秘下至掌心
如下栗塊者風秘也煩燥飲引小便赤而大便秘下至掌心
有汗者熱秘也腹脹腸中虛鳴或腸不利腰腹引痛者氣秘也
嘔吐清水不能食面青而瘦冷秘也或久病不能乳食腹不脹
不裏急後重雖久不大便者虛秘也凡此五秘者當隨證治之
若大便如常且不可以冷藥與服恐水住胃脈榮衛不行則瘡
疹亦不出矣又有患至五七日自然瀉者須用與理中丸等溫
腸胃藥若瀉住即止後服亦不下過熱此是當下當溫之證又

有瘡疹出正盛端氣急腹脹小便赤澀手掌心并腋下并
或睡中譫語大便不通者用四順飲子得氣通喘定腹不脹則
已之下之瘡紅快者更不須通也

○瘡疹或吐或瀉或不食

瘡疹之證或吐或瀉或不食者此由脾胃虛弱也小兒胃熱出
斑瘡大抵瘡疹多出於胃緣熱毒方作之際必多煩渴燥熱引
飲或於風寒家坐卧遂令冷熱相搏冷氣入胃故令胃冷則吐
脾冷則瀉脾胃皆虛則不食也當以治中益黃等隨證與之其
者隨宜增減以吐利止為度又有熱吐熱瀉則不同何以別之
蓋熱吐者手掌心并腋下熱而澀澀有汗發渴而臉赤而飲冷
未能言而渴者則一向飲乳聚其飲乳滿於胃臆不能消化吐
出射是熱吐也純吐了又急欲食乳是內熱而渴但不能言其
渴醫者不審見吐利便用燥藥熱極生風者害人甚衆非特瘡

疹有此他證亦不用此分熱吐熱瀉尤審熱瀉者小便赤澀而渴口燥咽乾皆當用五苓散竹葉半夏湯主之小兒不食亦有虛實二證或吐或利面青而目睛青黑色而不食乳者爲虛寒而不倉也宜溫之大小便如常面赤而壅或渴或腫中驚或咬齒目白睛黃赤氣喘或身熱而不食乳者此爲實熱中滿而不食乳也由如伏熱者亦不思食胃膈滿悶食故尤宜詳審

○瘡疹皆多在表不可妄下


傷風與寒以汗解汗者穀之精氣也瘡疹作膿血斑痧膿血斑痧血也古人以解利藥如升麻湯之類皆懼其血熱毒甚則瘡疹尤甚故少涼血以解其毒瘡疹亦易於將理何貴以轉瀉傷其臟腑脾胃也蓋臟腑脾胃既寒何以運行榮衛榮衛既遲瘡疹膿血斑痧何以蒸成故知傷寒則氣行汗出而已尚不可下况瘡疹在血氣溫運內不虛而外不寒則出而不伏陷失期不

觀內補散治癰疽至驗皆是燠血行榮衛藥今瘡疹與癰疽皆
瘡也何嘗以轉瀉而治癰疽也

○瘡疹陷伏倒靨

瘡疹陷伏倒靨方書稱倒靨而已殊不知內虛不能盡出者爲
陷伏外被風寒所迫或被惡氣衝觸而不得出者名倒靨然得
之有始末輕重不同若一藥用藥因茲夫橫者多矣蓋瘡疹已
出斑點爲始以血疱爲中以結膿爲末三者淺深不同
爲得不論夫既出斑點爲始者臟腑蒸蘊毒氣內外皆熱數日
既熱甚蘊斑毒於肌竅出於皮膚亦有陷伏亦有倒靨斑點始
出外被風寒所感使肌竅後閉血凝滯而不行必身疹四肢微
厥氣血盛實與風寒相搏於肌膚必大小便秘斑點不長或黑
色或身生青紫癰疹此爲倒靨也當此可溫肌發散風寒如紫
草解毒陳皮葡萄入齒僵蚕荷葉之類溫散寒邪然後熱氣復

行則斑出矣有胃虛而不能副榮衛者雖出而後沒故斑運白
色或黑色此內虛所至故出而無血氣以應之其人必不能食
乳或大便自利小便不赤而清或倦或嘔四肢微厥其由內胃
既虛自不能出此為陷伏也當此宜用溫辛之藥令其胃煖榮
衛復溫必自然出矣如理中湯活血散人齒散之類以溫之止
利甚者須薑附硫桂亦可用此治內自虛而陷伏者也若以血
斑為中者是紅斑出之後至足有斑為出齊斑疹毒方出盡也
自斑點生如豆起於肌皮之上所以血斑為中者未結膿血斑
疔之前證也血斑七日當結膿血斑疔當此或外被風寒所感
為倒靨或胃氣虛而吐瀉為陷伏者亦如前法治之可也血斑
是毒氣正盛湯熱內外彌滿無陰以收之血斑出至七日而當
結膿窠疔而愈今七日而尚如豆大血貫之不結膿窠此尚
毒氣內外貫注血熱相搏必復入於心矣二至危斃急以豬尾

膏涼心血使陰氣感之必隨時結痂花而愈古人以硃砂腦下
猪血等涼心藥治瘡疹是治其毒氣已出後心熱毒氣倍常則
用之也非治裏自弱而陷伏者非肌竅感寒而倒靨者可用也
陷伏倒靨皆虛寒證陷伏胃弱自不能出當溫之倒靨是風寒
外感於肌竅當發散故非猪尾膏證猪尾膏是治心熱大過而
不能自收歟結痂花者非為涼脾之藥也蓋素問云瘡瘍燥痛
痒皆出於心當血乾後紫黑而不結膿窠
內外貫注毒氣
必復於心則危矣以血乾結膿窠膿窠結痂花如結膿窠痂花
內外有感胃而生病者此觸胃之過治之無異於前斑點時用
藥也觀小兒數日戒食則胃虛熱甚氣耗作斑點膿窠則血弱
結痂花之際少增滋養藥衛調適寒溫藥以助之為佳病後服
解利藥亦不可緩也瘡疹未透心煩狂燥氣喘妄語或見鬼者
龍腦膏觸犯黑色者奪命膏黑陷者百祥丸藍振散四聖散入

散毒盛而黑色者山花湯宜毒膏良方治毒氣入臟而不出者
胸子指血酒活人書黑瘡子惡候無比散借金散朱砂散瘡
子反入抵聖九救生散玳瑁散化斑散瘡子蟹花蛇散麻黃湯
濕生蟲散搜攪按磨水牛旁散治黑色名鬼瘡子入齒猪血散
皆是熱盛毒氣倒繫者非治裏虛吐瀉不食而倒繫者如脾胃
虛吐瀉或斑未出醫人不識誤用涼藥冰却致令內伏不出胃
裏散主之服之汗出者不用控心散如無汗即服控心散後下
羌活散為良

○瘡疽黑陷耳聾反熱

五行以土旺制水五臟以脾制腎蓋土旺水升上而不下走泄
此五行相生相制使之既濟此五臟平和陰陽升降也且人平
居飲食以滋脾土脾土運化滋榮衛觀脾土於中上流肝榮肺
衛下以腎水不走泄為失其平則有太過不及之患何以知之

瘡痘出而耳熱冷此脾土勝腎水瘡痘陷而耳熱熱此腎水反勝脾土矣蓋耳熱者腎也體熱則血脈凝滯則穀氣盛也錢氏百祥丸瀉膀胱腎水令脾土復旺當此致於不救者亦十有八九亦豈得已而用之哉當此之際不用百祥丸則無治法毒氣去而真氣不絕者猶活不去其毒則束手矣如活人書厥陰證土敗木賊用承氣湯瀉其毒氣亦豈得已而用之當此而不下亦不可也愚思之與其瘡痘用百祥丸傷寒承氣湯下其毒與若救脾土於未侵之先治其未然者為良麼幾不致狼狽之地成功於不見危象為妙

○瘡黑亦有逆順者

瘡疹出者為順黑蘖陷伏者為逆然其中黑蘖亦有順者此為瘡逆脾氣乃強則脾土盛制水也是脾強而腎退雖黑蘖而忽瀉膿血并疏死者順此必藉服補脾藥脾氣得盛而不衰其外

肢絡瘡黑腐而不老者得脾臟不衰則心肺肝腎有以救之素問云脾病則五臟危今脾土既盛餘四臟則無慮矣臟腑既無虧盈則不能為害又有黑腐而逆者乃水穀不消滯乳不化者逆是脾虛不能制腎故水穀乳食不化而自泄此脾土既衰於裏外有瘡疹黑腐者是毒氣陷伏必先入脾脾盛而受毒四臟皆困而危殆矣是以為逆為難治掌觀古書云病在臟者半死半生病在表者輕以此瘡疹瀉膿血瘡痂者雖順非可為常治法此亦九死一生之證爾

○瘡疹出遲朝夜啼哭

神視魄益智 五臟之正神也喜怒哀憂恐五臟之情偽也人之五臟調暢則安通抑鬱則煩悶故小兒瘡疹者蘊非常之熱毒為瘡疹而外未得出在臟腑而不能散故毒怒不常悲恐兩利則神不能安而朝夜啼哭也當此醫者察其蘊毒在表在裏

當隨證治。世若發熱，湯水面赤，小便赤，五微表令出可也。若身無熱，大便秘，腹脹滿者，當令大便通。大抵內無壅滯之氣，則榮衛通行，神魂泰然。瘡疹亦出快矣。醫者不知察此，見朝文啼哭，或以為心熱，或以為聚痰，或涼或下，不能去其表裏熱毒，復使其冷熱相併，反生多疾，不可不知。

○瘡疹凸凹生瘡

瘡疹結膿痂，可抓碎之，則不成痂痕。今瘡痂雖結，痂猶黑，肌肉致令凸凹也。故在結膿未成，乾死抓去之，則不成痂痕矣。有瘡疹愈而再生者，此因瘡疹安後失解利，毒氣留滯，敗熱於肌肉之間也。宜用明膠散，次服密陀僧散、臙粉散、鴈屎白散、牡蠣散、馬齒莧散、秦皮散等，以傳之為良。與其用藥於已再生瘡疹之後，莫若解毒於未再成瘡疹之先。

○瘡疹大便如常

脾胃納穀氣大小腸出滓粕此平居察虛實冷熱之要蓋飲食進退則知人穀氣之虛實大小便滑澀則知人之冷熱也熱則秘澀而不通冷則滑泄而無度今大便如常則知臟腑平和無大熱大冷之患故不在補瀉亦不可妄攻擊也且活人書云清便自調則是大便如常又云大便堅小便數不可用承氣湯攻之是津液已行於小便故但以麻仁脾約丸用之可也小便清者不可下此無裏熱也大便硬而小便少者未可攻此津液當還入胃中大便自過也陽明病自汗出苦煩汗小便自利者不可下此表裏皆亡津液也又云小便赤却當下此是表裏證俱見以五苓散主之又云不大便六七日頭疼有熱者是裏證當下小便清者知不在裏仍在表又云大便硬而脈沉細是裏證當下以此觀之古人治病未有不審飲食進退大小便滑澀自外而知裏此非專治瘡疹之法若害瘡疹或醫他病用之亦

良况嬰童未能言者尤用此

○瘡疹服熱藥則損目服冷藥則無不夭傷

火制金木制土水生木木生火皆自然之理也順之則安逆之則否故瘡疹是熱而生又益以熱藥則損目抑之以冷藥則為陷伏蓋人身無非常之熱亦無非常之冷但溫和而已今瘡疹身暴蘊非常之熱而鬱發肌腠蒸之為瘡疹順其熱則出而毒散及其熱過則損目為咽痛為癰瘍為狂眩抑之以冷為陷伏為黑靨為夭傷故善醫者使陽不至虧盈陰不至慙伏調適中和而已苟為不然陽勝則熱盛而生風肝應於目無不害目者陰盛則脾土無燥氣腎水反勝為黑靨陷伏則夭傷者多矣不可不察

○斑爛

病當發散而不發散則毒氣閉塞胃滯喘促悶亂而不知人不

當發散而強發散則熱毒隨陽出於肌竅皆為斑疹遍身無數
肌肉如爛故名曰斑爛此失於不善表者之過也治斑疹之法
調脾進食大便令不秘不利養榮衛以生肌解毒則無目赤無
咽痛無口瘡無吐衄等證解之不至於冷調養不至於熱最為
良法也但斑爛發膿痛甚者用乾黃土羅為細末傅之輕者用
芒硝猪膽汁調塗瘡上勿令動著直候瘡疹痧疔自落大段瘡
發多不通卧席者即用麥麩簞卧將息最為佳又有因於表過
多外則斑爛為陽氣在外內虛生寒臟腑自利急當救裏如理
中豆蔻之類臟腑自溫平其瘡必愈

○感寒與瘡疹伏熱相雜而發者

瘡疹是五臟伏熱於裏因熱蒸而以外其感冒是外感寒邪漸
伏入裏且感寒始發則頭疼發熱惡寒鼻流清涕左頰有青以
者感寒也夫感寒者寒極則生熱乎熱盛則實實則動所伏瘡

疹之寒熱交作陰陽混雜證候非一故醫者若汗若下則疹疹隨出蓋感寒在表蘊熱在裏寒極而生熱熱則隨出若不去其寒則疹疹不能出但表證身熱而喘則微汗和解之裏證腹脹大便秘小便赤澀者則微利之煩燥渴甚者但利小便胃滿食不下者宜吐之此發汗吐下利小便皆是去感寒伏熱邪氣也治之則當發汗吐下利小便隨手而愈但用藥者不可令藥太過最為良法如過於表者疹疹出則為斑爛為口傷爛去下之過者為否悶為內陷為下膿血當此細推之疹疹非感寒之此緣有疹疹隨出故用藥者不可不謹

○瘡毒不散

治病當隨時變通不可泥於一曲也且瘡疹之證如熱毒在表者不可下下之則裏虛為害非虛亦不可助之助之裏有壅熱為害亦不可令有大熱故前人云斑疹未見者以葛根湯梔枳

子湯惺惺散紫草飲子解利之但裏不至冷大便不至利氣實者可服之也或有不問虛實以胡荽酒洒之以葡萄酒飲之又火煨人齒頭調服之若盛實者服之則為害蓋胡荽酒葡萄酒以熱毒氣貫注耳目口鼻悉平咽中閉塞大便堅秘小便如血是毒毒不散則熱毒無從出也毒氣攻臟腑故使口而不起謂之倒靨蓋毒不散又不能解之至於斃者不可勝數矣蓋陽熱無陰氣以守之當此之際豈不觀六便堅秘小便皆如血若有此證者猪尾骨化斑湯犀角地黃湯犀角玳瑁湯可選而用之也用之則毒散榮衛無滯瘡疹自出矣皆常用已驗之法姑條次于下其疾始覺頭疼發熱或微熱而後作寒煩燥咽痛者則以四味升麻湯瘡痒或癩疹者則以荆芥湯面赤大便秘小便赤而嘔者以小柴胡湯不惡寒但惡燥而小便濇又多渴

而成赤斑點者以竹葉湯犀角飲子大便不通者與四順飲子
唇甚謄語大便不通與承氣湯若大便自利黑黃色毒氣亦有
折出大便已利又得調氣藥以助之其瘡亦稀肌生斑者以自
然出者不可表也斑生而至足

○飲乳嬰兒與能食童子用藥不同

夫飲乳嬰兒者由人之生胃氣未固膚革未成飲乳易傷風邪
易入臟腑嬌嫩血氣懦弱肌體不密精神易弊故用藥當審其
大小輕重而用之可也蓋差之毫釐立見危殆安可與能食童
子同用藥也且能食童子自絕乳後食火灼炮炙之物酒麪并
肥魚肉滋味安可與飲乳嬰兒同用藥也夫嬰兒有疾服藥但
與乳母服之為要法譬如童子與食與嬰兒飲乳同乳母既服
其藥必流入乳兒亦飲之是以童子能食服藥也免其慄悍毒
烈之藥蒸薰臟腑亦為良法且能食童子穀氣既實臟腑充盈

如生疾病能食不大便裏急後重手掌心并腋下汗當令大便如常過心熱啼哭小便不通心神不安當利其小便飲乳嬰兒有斯疾但將斯藥與乳母服是亦嬰兒服之也

○瘡疹本稀不可發表

夫傷寒表證須看榮衛淺深故仲景有發汗者有調榮衛者有和解者三者分輕重虛實淺深也瘡疹固蘊熱毒而斑生亦晉熱氣深淺故瘡疹本稀者為不可表小兒數日熱運於小自快但以升麻湯荆芥散主之出雖少足心有者此出齊不可表也出齊皆成血疱或已出膿疱或水疱或至於痂死者皆不可表此臟氣既平榮衛既和自然而愈妄加治療補之則熱瀰之則寒表之為斑爛愈生多疾矣何謂瘡本稀蓋瘡疹無定數如汗之無多寡但看所蘊熱毒之微盛爾且瘡疹出而不甚熱既出而喜笑如常無寒熱無煩燥諸證蓋有少便膿血痂死此皆瘡

本稀不可表也但鮮毒而已若本稀而強欲發之則為斑爛為
倒靨為腫脫為中寒為里熱不可不知

○瘡疹無凝滯則勿表勿下

病有遲速蓋日數待榮衛以祛運其蘊毒而出也且瘡疹熱數
日運熱毒為赤斑點出於肌膚中至足有方為出疹蓋斑點長
成血疱血疱成膿疱膿疱結痂此雖大畧之言瘡疹必先斑
次血疱又次膿疱又次結痂此自然之序善治病者不可先
時而後亦不可後時而先也蓋傷寒表證出汗而愈其有一二
日便汗出者則名為狂汗雖出之必復重又期六七日正汗出
則愈矣傷寒裏證當下則下之若下早為結胃為痞氣蓋病深
在裏者則可下以此言之比之治瘡疹或表或下若太早則病
毒不去真氣受弊有如瘡疹自然出快不勝其幸若反加妄表
妄下適以為害然發表則熱氣承表而出不知自然微盛為斑

爛為倒靨黑為虛脫者多矣妄下則為內虛為陷伏為大傷宜審
究之可也合表合下證各別具詳之矣

○瘡痂起而能食

病生於裏而達於表觀其表而知其裏亦在乎熟之而已矣且
瘡痂起而能食者蓋瘡疹出於表而裏虛當食少今陽氣出表
能食為裏不虛而有熱本方用大黃丸下之亦更看津與必證
然後用之若瘡痂起而能食大小便秘而喘滿面赤胃弱者則
宜下之若無此證知其熱便下之則誤矣豈不謂瘡痂起而能
食便下之但知其中不虛爾雖瘡起而能食無別熱毒證則不
必下也

○黑靨黑帶未發寒

夫黑靨世俗之稱有二一曰倒靨二曰陷伏且倒靨者四證一
則感風寒二則毒氣弥盛心熱與外熱壅鬱蒸不消毒故入裏

三則飲食少而內虛臟腑或泄利無陽以應之遂倒靨四則不
禁房室穢氣衝觸名同倒靨所得之由既不同用藥救之宜得
不異若不究其源一槩論之則無不大傷不特此爾一若疥疹
正出坐卧當風或失於蓋覆感外風寒搏於肌膚之中榮衛受
寒必發熱而惡寒頭痛鼻流清涕當此之際宜以溫辛藥表散
寒氣若失於治療榮衛受寒不解加寒戰而喘悶則為倒靨著
一也二者五臟蘊積其熱出於肌膚小兒陽盛而陰微熱毒滯
漫心熱壅滯而不收使外不得作膿結痂肉不得毒氣消散
當此之際用涼藥解毒利小便藥以治之令其毒氣漸消則愈
苟失其治療則為倒靨者二也三者其人稟受氣怯或因患而
飲食少遂致脾胃虛弱因虛而生寒因寒而下利因利而內虛
冷當此宜急用進食固臟腑藥以溫之臟腑既平因飲食進乎
足溫煖則瘡疹復出矣世有醫者瘡子是熱不敢用溫藥遂致

倒靨者三也四者瘡疹正盛內外無寒熱無虛實證候而不出者此由不能禁忌穢氣鬱胃房勞觸犯若有此犯則瘡疹不出毒氣入心悶亂而斃若已出之後觸之則令其瘡黑爛痛極如刀割其癩痕經年黑色此仲景所謂瘡疹未發之間宜於房室燒赤术猪甲二物辟惡氣謹戒淫慾常令人守房室門戶忌生人入房恐有觸犯令兒瘡疹難出也其他或得上喘面青黃者輕甚而至斃者不可救藥此謂倒靨者四也夫一日感寒宜溫表二日內盛毒復入裏宜利小便解毒三日內虛宜溫表四日觸犯宜禁忌九此四者治療失度用藥差殊則難救矣夫所謂倒靨其不發寒者為輕倒靨發寒者為重蓋脾之土弱反被腎水所勝故錢氏用兩祥丸瀉膀胱之毒安之黑靨而發寒此是誤認瘡疹證候為他疾而用下之脾暴虛極至於發寒以致為殆錢氏用兩祥丸以瀉膀胱之毒是助氣復還以助脾土者則可

矣若言瀉膀胱經水必令脾土自勝此好奇者之言蓋黑黧為腎但瀉膀胱經毒爾殊不知先悞下之則脾土虛又言瀉膀胱經水豈不知臟腑根本皆虛是謂虛虛前人之意但瀉去膀胱經毒氣也故曰黑黧需未發寒者稍輕況黑黧是逆而發寒者為重愚因而詳論之正如活人書云厥陰證土敗木賊乃胃土受肝木所剋則心火腎水不能既濟令人胃味以大承氣湯下之胃毒既去水升火降則寒熱作而大汗解矣承氣湯去百祥九皆去毒之意

○可下證

瘡疽出大盛為血癰在肌膚之上至三日或五六日當結膿血瘀死而愈今瘡疽六七日不結膿血瘀死者此由毒氣盛而裏外貫注若不速解之毒氣復入為倒靨宜豬尾膏膏脉與外證審諦方可下之其血癰至五七日不結痂能食而喘發渴腹脹

昏睡語語不大便者用承氣湯川黃散下之如作渴發熱面赤
悶亂大小便澀或大吐者當利其小便宜通關散主之又瘡疹
已出定大便不通瘡出膿汁不乾者牛黃丹又有瘡疹證而未
出胃熱發溫狀氣壅腹脹滿大小便赤澀瞢中驚悸煩渴口乾
脉沉大滑數此是毒盛而不能泄常用利毒丸下之裏無滯氣
榮衛升降瘡疹自出矣此皆合下證也又有瘡黑陷大便自利
腹脹者乃虛寒證也當溫之不下

論雜病第四

○諸惡證

夫痘子出而後不出或大瀉而止或有此候皆因瘡毒出而服
冷藥遏熱毒在肺中也故煩燥迷悶不食或大小便難皆因候
也瘡痘帶白膿者其毒輕或紫黑色隱伏在於肌肉裏者其毒
重甚者五臟咽喉內皆有瘡其不大小便熱便澀出血而焦黑

驚生膿者死鼻有黑氣者死或痘疹未出毒氣內逼目睛上
竅驚叫有如驚風者此乃瘡欲出之候也若誤認為驚調治必
使毒氣內蓄邪熱不泄亦乃死候或有瘡痘既出謔語不仁此
亦惡候或見是瘡以藥解利見瘡疹反沒者乃死宜急溫之復
出乃愈或瘡作白泡忽然伏入臟腑漸作紫黑無膿日夜煩悶
啼哭其證尤惡服化毒散其毒必手足心出乃差此是五死一
生之候若便血瘡陷無膿者死其有猛毒痘瘡不出者一生以
地黃雄黃令飲不可太多多則反有所損前證皆惡候

○先知節候陰陽臟腑虛實

夫稟氣盛者夏酷暑而不熱冬嚴寒而不冷此裏實而寒暑不
能侵之地稟氣弱者未寒先寒未熱先熱故未有十日天寒日
陰則感寒濕而儒瀉未有十日天溫日明則伏熱而中暍此虛
弱之人常態也蓋先知節氣者能辨陰陽寒暑出入之盛衰素

問云陽盛人能冬不能夏陰盛人能夏不能冬此亦人之虛實
與寒暑相為否泰者矣且立夏氣變純陽萬物茂盛用藥者用
熱遠熱如桂枝麻黃大青龍湯并諸熱藥必加知母升麻石膏
輩是不盡其熱藥也且立冬兩陰俱盡氣合純陰用藥者用寒
遠寒如服諸涼劑服湯利過者止後服不必盡劑是不盡用涼
藥也是寒月不盡用涼藥若盡用涼藥表裏皆寒人不能當故
也治瘡疹亦當依此隨虛實寒溫陰陽出入而用藥也豈可拘
一證一藥為盡而已矣病人素有盛實或素有虛寒者並用古
方不在加減尔且春分陽漸在外而陰漸在內秋分陽漸在內
而陰漸在外用藥者豈得而同諸此按四時陰陽迎合臟腑內
外虛實而用之故時當陽出而陰入則實者愈陰出而陽入則
虛者愈故陽出而陰入者虛者病陰出而陽入者實者病此其
常理不變者也如冬溫虛者安而實者病夏熱則實者安而虛

者病此皆節氣陰陽虛實使之也冬溫暖夏寒涼非節之為病者在人將攝而何尔所以錢氏治瘡痘言春夏順而秋冬逆是論陰陽出入迎合表裏之意也

○行房觸犯燒赤木猪甲

伏積熱毒甚者為瘡疹方其榮衛被熱毒所蒸毒出為斑痘方其出肌膚受毒靜以守之則順出而愈若加觸以不潔之氣薰以行房觸犯陰陽相感毒氣著於人則使瘡疹入裏毒氣入心悶亂而死若已出之後觸則令瘡黑爛極如刀割縱或瘡疹得安癰痕經年黑色仲景論瘡疹未出之間宜於房室內燒赤木猪甲二物辟惡氣謹戒飲酒嗜慾令人守房室門戶恐生人入有觸犯令小兒瘡疹難出也如有觸犯或有面青黃色者猶輕要之安胡荽於左右上下安頰之能解狐臭雜惡穢污之氣更燒乳香令室中香不絕辟除一切惡氣兼令易出易結痂或瘡

疹畏雜惡氣不可不謹者譬如柑脯同處一壞皆壞古語云樹得柱而枯雖黃遇胡粉而黑抑亦物類相感云爾

○初生服生地黃汁令不生瘡

錢氏論瘡疹是母腹中所受穢毒故小兒患瘡疹五臟皆見證故前人亦先有以制之也千金論云方嬰兒初生宜進生地黃汁點孩兒口中令便下黑穢則至老亦不害瘡疹蓋便下黑者此是腹中所受穢毒令人但見簡易平直而不用抑亦顧目前不思後患者歟

○瘡疹毒氣令胃爛便血

小兒胃熱發斑其斑既出於肌膚今瘡疹正出或外被風寒所伏或毒氣太盛熱毒壅遏則出不快蓋毒氣復轉還於裏者誤服涼藥使腠理外不得出於肌膚毒氣倒於裏者有按惡氣衝觸不離房事復觸入裏甚者皆可為胃爛便血各隨證救之

如風寒所伏者當解表而散之治瘡疹麻黃湯是也內外毒氣
壅遏復入裏當解毒如犀角湯之類是也冷氣入胃水伏者當
溫之胃愛散之類是也惡氣薰觸不謹房事觸伏者當燒艾香
赤木猪甲之類服以蘇合香丸等以禦之又有毒氣內外有所
感冒陷伏者急以麻黃湯主之王氏手集白花蛇散撮攪投水
煮服之無不立効如有內外觸冒失於治療遂至胃爛便血此
證最惡急宜用犀角地黃湯并草散以解之解之漸甦瘡出
者活神昏胃悶者死

○餘毒失解利則嘔吐并諸雜證

脾胃主納而不出大小腸主出而不納是平居飲食水穀糟粕
出納也常論胃主納食而瘡疹後嘔逆是有邪氣相干使胃逆
而不順故使氣逆而吐也其吐有冷吐有熱吐瘡疹病後吐者
此餘毒在胃不解當仔細辨驗終是不同其熱毒在胃而吐者

令人心煩作渴小兒不住食乳者是渴也小便赤澀手掌心有汗或熱面赤引飲停於胃中成痰膈中不利縱能食乳聚滿吐
出如射則一時胃中稍寬又復飲乳者渴也飲乳又吐脉洪數
此熱吐也冷吐者不渴飲食與水隨喫隨吐面青手白足冷大
小便利宜細辨之有熱有餘毒在胃脘嘔吐者宜服黃芩散
芩散人參針葉湯若餘毒在中口舌生瘡下部亦有瘡或下膿
血服黃連散三黃熟艾湯發喘而煩燥小便不利者燈心湯若
胃熱齒齦腫痛妨其嚙食飢不欲食煩熱面黃者宜服甘露飲
槐花散如毒入目者服淨心散最良咽喉痛并嗽不已者麻黃
湯加麝香服之或大便不通傳熱毒攻於臟腑及眼并咽喉腫
塞口舌壞爛者以如聖湯紫河車散紫雪之類可選而用之皆
解餘毒之要藥也

預服油痢以解瘡毒

防應於未然者則思熱毒未成瘡痘時預服油劑以解之蓋小兒四肢微熱食物似減頭髮乾立或時額微熱則與生油劑飲之每夜如方法與飲似竟四肢熱服之良久就卧多至三五服大小便利四肢熱減邪毒漸退疹痘雖出亦輕尤良法也

○斑疹熱則出愈雖大便不通小便便如血或為癰身軀破裂似是非而非若同而異醫者當詳審於疑似之間言斑疹得熱則以愈難此非得熱而愈出難為氣不通滯與毒氣混熱不行故出難非獨熱而難出也胡不觀大便不通是氣不通行或或便血或為癰瘡或肌肉破裂以此觀之氣不通又熱毒之氣壅盛毒在腸中則血滲入腸為便血毒壅肢絡不行為癰瘡為身軀破裂使其大便通小便利則無斯患矣有此證者宜服犀角地黃湯白虎湯升麻湯當雪之類便血以牛黃散可選而用之

○誤以巴豆丸下之則內壅而熱不除

表熱而傷脛故宜湯液以散之取食積宜下之用九子藥磨之
蓋用九子藥者取收攝之義也今病瘡疹是表熱若用九子藥
反攻其裏則表熱陷伏於裏其熱愈不除復為倒靨為便膜
血肌膏毒壅遏不通為痘腫為腫毒瘡疹不可用巴豆九子藥
者但能取腸中積故也非瘡疹表熱者可用

○瘡疹不可用巴豆水銀輕粉

小兒頭痛身有大熱口鼻有熱咽乾痛口煩生瘡兩目如火耳
尖手足指冷脈洪大而作渴面赤增寒心逆熱口臭此是伏瘡
子候先當去熱毒邪氣用大黃湯煮湯液蕩滌其表熱表熱散
則諸疾皆愈矣昧者以巴豆水銀輕粉此藥無去表藥之理反
傷腸也蓋巴豆水銀輕粉但能去臟中積熱而已豈可以
為瘡疹表熱者用則用之者大傷不可不成

熱毒攻肝衝於目

肺金燥心火熱肝木風脾土溫各有所統夫肝木勝脾土表且風入勝脾熱則為陽風為秘結為下鮮血冷則為不食為噎逆為肢厥此五行相生相克之意也熱則生風由大盛而風伏肺金既受火尅金衰不能制木則無金以制之木勝肝旺心火炎上肝竅於目心熱壅則衝於目故瘡疔之始最宜防備之使之視井則欲觀深視遠則自運於目得陰氣感之揉臙脂則欲涼血散毒氣服以黍粘荆芥防風已去其風傳以白芥子末於兩脚心瘡痘則不入於眼是皆防微杜漸使神水不被風毒熱壅之害得無睛脹凹凸青暗之憂方書多稱於此卷首者欲消目疾於未然不可不察

○瘡疹後餘毒咳嗽脇痛

夫血氣者陰陽之男女水火者陰陽之徵兆左右者陰陽之道路今瘡疹病後咳嗽左右脇痛飲食不下此餘毒所瞞氣不能

井降也且咳嗽者由陽不降心火熾於肺金也脇痛者脇居人之左右左右者陰陽之道路氣之所行處今脇痛是氣不能升降也飲食不下者由呼吸升降之間脾受穀味今氣不能升降脾氣不能運磨水穀也數者但解毒毒去然後真氣自育當以赤茯苓湯導心火利小腸小柴胡湯治咳嗽脇痛二和散調頂陰陽則自愈矣

○傷寒熱毒甚則不可不發表

傷寒熱毒在表未能作汗或當汗而不得汗暴熱灼於肌膚故發斑疹疹痘也其痘色白或赤如火丹瘡頭瘰癧白膿者輕若紫色作根隱隱在肌肉者甚重五內七竅皆有瘡其形如豆故以名焉此乃傷寒發痘小兒肌肉嬌嫩多有此故因正氣之

○瘡疹餘毒不盡順渴育痛

熱在表而生瘡疹瘡疹已出將愈則表雖退有餘毒在裏則令

小兒膏滿煩燥而渴此皆失於解利熱毒不散致使也宜黃連散燈心散黃茶散并露散皆可選而用之

○瘡疹不結痂死

瘡疹因熱而出又因大熱甚而不能結痂死是以內外蒸鬱無陰氣以欽之故也前人以宣風散等之以生羣散解之使熱不壅脹必結痂死矣又有發如膿窠不肯作厭者謂砂糖水與喫即結死此法須顧瘡子未出盡切不可用蓋瘡子初發而食甜物如糖蜜棗枯必使瘡子入目尤宜忌之此云用砂糖者走瘡子作膿窠毒氣已定而用之庶不為目害矣又有血疱出已七日不結痂死者宜用猪尾膏則愈矣

○辨瘡疹并水瘡子入大腸

疹與痘輕重不同疹自衣而出於腑則輕痘自裏而出於臟則重世俗但見疹見痘方知輕重未能預知而防備然疹與痘其

初何以辨之茅先生論有見於未然且早晨渾身微熱至日午
後大熱眼睛黃色兩脇下汲上然動甚至發如鷄風狀亦身有
大熱手足逆冷此病屬厥治以獨勝散發之以和平生津藥潤
之此必是瘡痘謹不可投涼藥恐冰入大腸而痘子不出則瀉
下如赤豆汁及朝出而暮黑或顙頰赤色如掌大口內有臭氣
唇焦目閉腹脹者此必死候此是瘡毒入裏由用利藥裏血毒
陷入腸中或便膿或便赤汁皆惡候也且疹候早晨微熱午後
亦大熱眼白赤色而不黃手足冷而吐逆此屬腑為疹治法如
治瘡痘皆同輒用利藥變為惡候

○結核腫毒

瘡毒熱毒藏於肌膚使榮衛流注失度則榮衛合行而不平為
之壅遏壅遏則結核腫毒或為瘡癰或為瘡瘍發於頭頂手
是肢節間甚者則為癰毒此熱毒壅遏之過也亦令人咽膈不

利痰涎壅塞咳嗽咽乾眼赤臉頰煩燥腫宜以消毒散小紫胡
湯最驗腫毒出膿數日不止體虛煩熱頭痛昏悶者黃芩
散大便不通者大黃散主之腫毒赤腫初生者燒鷄毛水傳之
醋調伏龍肝傳之地松胡荑以傳之鷄子清調亦小豆末以傳
之地龍糞新水以傳之并馬齒莧龍葵葉鷄腸草芸薹葉景天
藥皆可搗傳之赤腫不散成瘡而未得頭出者馬鞭草以傳之

○冬溫發斑癰疹如錦紋

活人書云冬月暄暖而溫毒發斑癰疹如錦紋者以冬月暄暖
寒毒至春始發病初在表在已發汗或未發汗表證未罷毒不
散故發斑以黑膏主之又有冬月溫暖非節耗戾之氣冬未即
病至春或被積寒所折毒氣不得泄至天氣暄暖溫毒始發則
肌膚斑爛癰疹如錦紋咳而心悶但嘔清汁者葛根橘皮湯主
之小兒常有此證令兒心悶咳嗽嘔吐清水醫者不辨作胃寒

治之轉如悶亂狀若驚癇遂生他疾但咳嗽而吐汁者知其心
悶矣預宜服葛根橘皮湯則立愈

○瘡疹用百祥丸證

黑紫乾陷者下以百祥丸不黑者謹勿下要之紫黑乾陷則下
之無疑矣然當下有數證宜仔細以外證與脉別之有感風寒
而黑陷者則宜溫散之有內虛自利而陷者則宜溫之有下之
早毒氣入裏而陷者則宜溫而表出之有被外物衝觸而陷者
則宜薰解之其用藥皆不同又有蘊積毒氣深而內外蒸鬱瘡
起能食不結痂疔毒氣不得散大小便秘腰脹而陷者為其毒
氣入裏宜用百祥丸瀉膀胱之毒服之身溫飲水者可治以脾
旺而勝腎水寒去而復溫則瘡疹復出矣若寒戰不已身冷汗
出耳聾反熱者死要之錢氏辨腎氣太旺脾虛不能制之此寒
氣太旺腎氣不溫瘡疹復陷而不出矣下後身熱氣溫飲飲水

者此寒去而後溫為可治以此而言瘡疹不可妄下故不須溫脾胃暖血氣也錢氏言瀉膀胱水於已瀉之後不瀉脾土於未瀉之先尤為盡善盡美矣

○瘡疹後患目翳忌點藥

湯散膏丹之殊異多刺點洗之不同且瘡疹之為目翳者毒氣自臟裏而達外治之要法但活血解毒而已活血不至於熱解毒不至於冷得其血活毒散則睛不變血不怯不致凹凸損陷是為良法也方其病抵自裏而外始者毒氣在於臟腑外延於筋絡筋絡而至目其病深似非點藥可取効蓋點藥非毒則冷必相攻擊反以為害前人有所不取也瘡疹後患目不在點藥故辨及之

○冬月預服三豆飲子

龐氏云冬令溫燥當時便服三豆飲子以解其毒則春夏不生

瘡疹矣蓋冬令風寒水烈是謂閉藏之時此天地之正氣也冬
月天氣收斂是冬應寒而反熱初之而非其時有其氣小兒抱
抱陽以生至春必發瘡疹預服三豆飲子以菉豆赤小豆黑豆
煎以甘草淺竹葉木通砂糖煎之臨睡以飲之則解一切熱毒
冬月隨受熱而隨解之也至春夏間則無瘡痘之患縱有亦輕
此乃冬月煖時預服之也

○瘡疹入目防備法

瘡疹方出間欲使不入耳目可噴胡荽酒於耳目邊或以黃蘗
末水調傳兩目蒸以白芥子末水調傳兩腳心乃抱兒令目投
葉五七枚於井水中使寒瘡不入目中此皆愛護目之法也又
有忌食之法如醬醋五味牛鷄鴨背不可食蓋小兒患芥子
食鷄鴨卵未有不患目者雖瘡疹已愈數月尚不可與
食之亦為目患此皆為瘡疹之所忌但令小兒食淡物為淡猪

肉淡餅之類不能食淡物者入少鹽無害患瘡疹之家亦不可煮鷄鵝鴨卵之氣相雜亦能損目不可不知

○瘡疹攻咽毒

瘡疹咽痛者由心胃有熱衝於咽故咽乾而痛口舌生瘡上衝齦腫而牙齒搖動者宜服甘露飲子欲涼膈去痰則服消毒散咽喉腫痛者宜如聖散消毒散心煩者宜鼠粘子湯冬月老幼皆可服之則春夏不生瘡瘍也有聲瘡不出舌頰生瘡煩悶熱面赤者以紫河車散主之咽痺水漿不下者以紫雪主之已上諸證屬熱須是臟腑亦熱者方可用之如上焦有熱其人若小便清或大便稀澀是臟腑無熱則別以清上溫下藥兼服不可一槩而用藥也已上並可以小柴胡湯尤宜

○瘡疹大小便不通

瘡疹熱毒在裏令兒大小便不通熱毒蘊而不散則不結痂死
及其熱氣少而下之早則為陷伏如大小便不通欲以藥下之
者須是微覺腹脹滿而喘按之腹微實手掌心并腋下汗出者
此有熱毒燥糞在裏宜下之瘡疹大便不通者川芎散瘡疹既
出定大便不通瘡出膿汁不乾敗毒牛黃丹大承氣湯又有疹
疹欲出胃熱發溫壯氣壅腹滿大小便赤澀睡中驚煩渴口舌
乾手足微冷多睡時嗽涎沫實沉大滑數宜服利毒丸心煩燥
渴小便赤澀者通關散前四藥皆有熱證方可用之性寒通利
故也不可妄投為害不輕

○乳下見兒服湯藥多則反為累

小兒如水中之泡草頭之露以表用藥無令造次為為小兒臟
腑嬌嫩血氣懦弱肌膚不密精神易憊故言不易醫也然乳下
嬰兒周歲二三歲有病并宜少服湯藥量其大小但將藥與乳

母服之為妙忌一切藥與兒啖恐反生多疾蓋藥性慥悍毒烈非寒即熱不表即下或飲或服多則反為累蓋其攻擊太甚不可不察大抵在簡而當則病除又不損氣若泛然而用非止不効藥性處之必反為害故瘡疹出而無他証者宜少與湯藥

○瘡疹各溫當先下其毒

夏月陽氣在外陰氣在內冬月陰氣在外陽氣在內其陽氣在外人喜冷陰氣在外則人喜熱蓋夏月扶陰以助陽冬月扶陽以助陰以平為期人有盛衰與四時不相諧則反為病且夏月天氣大熱則人食冷以助陰素問云用熱遠熱者是也亦不可過冷過冷則逆正氣為害且老人氣衰而火少夏月豈可過冷也嬰童自然陽盛而火壯雖冬月豈可多食熱物其能食童子無能啜熱乳嬰兒如冬月食火炮炙略之物乳母恣食酒麪甘

肥便与兒乳其熱毒因積微成者又遇冬月天氣暄暖則內外
蘊熱於臟腑至春陽發生其毒熱隨榮衛而出遂成瘡疹無復
疑慮如冬月應寒而反熱此是冬溫毒氣在臟未出於肌膚間
當冬月便疎利解去其毒可也如葛根湯三豆飲子消毒飲子三黃丸當歸飲
油荆穗赤散化毒丹之類皆可隨輕重冬月溫煖時皆可選用
用之也

○瘡疹便膿血

瘡疹病後餘毒不解毒熱入胃令兒便血日夜無度腹痛啼哭
者宜用牛黃散又有渾身熱下痢黃牛膿血者薤白散解之或
胃風湯尤佳小便赤而煩宜以導赤散導角地黄湯主之

○瘡疹膿汁不乾

小兒瘡疹太盛膿汁水粘不可着席不可轉側疼痛日用黃土
末傅之便乾欲不成癰瘰者以牛糞晒乾火煉成粉研如蛤粉

相以用綿撲有瘡痛聚膿甚者以黃土細羅為末傅之。大段不通卧席者以麥穗不計多少簞卧將息最為要法。

○瘡疹入目用藥

心熱毒生肝風肝主目熱毒衝之故初目患以涼肝丸服之。毒皮散洗之。紫蒙花散服之。或因食毒物壅突出外者仙靈脾散。暴赤腫痛者棘麻子散。患半年一年餘者蟬蛻散。出正盛而不令入目者調肝散。入眼成翳者瓜蔓散。生翳遮膜者威靈仙散。入目痛楚傷目者浮萍散。生翳者撥雲散。風熱攻眼者并泉石散。目中豆瘡成翳者大黃散。貼之赤脉侵睛者羚羊角丸。豆瘡入目昏暗者金花散。瘡入目裏侵睛者樺皮散。翳障不見光明者蟬花散為良。

○瘡疹後餘毒諸方

瘡疹熱毒內外皆作今瘡疹已出而結痂。而餘毒在臟者宜解。

利之若解之精。至於生病多端。瘡疹出盡後大便秘者宜服
大青散。小便赤澀者宜服黃芩散。胃中有熱。胃中有邪氣而嘔
面赤而渴。大便秘或如常。或瘡疹後下利色黃者。黃連散煩喘
小便不利者。燈心湯。槐花散。發渴飲水下血不止者。消毒散。薄
荷湯。調下黃芩散服之。

○消癰痕

瘡疹生於肌中。瘡痂不可早去之。而出風早則為之癰疹。肌
膚為凹凸。宜用鵬散。酒調服之。蜜陀僧水研塗之。瘰癧散。胡
粉散。鷹屎白散。馬齒散。猪胆散。羊胆散。雞散。升麻水。豆散。黃
藥散。白蜜羊脂。痔瘡。金散皆可。透而用之。欲無癰痕者在結
膿結。死勿令癰。

○痘癰

痘癰者。瘡疹毒氣留。

而不得出。毒氣壅遏於肌膚。故使肌膚。

偏盛而成痘

又

瘡疹

解利是致毒氣不散外不

得泄於肌膚內無由入

入

解利則為痘

或為腫毒

之

之後便以消毒散升

令頭項膏脇肢內赤

赤

之

之

選而解之失於解利腫

毒所發未成膿者小柴

毒所發未成膿者小柴

柴

煎服之立愈又有稟受

怯弱病瘡疹後面青不能飲食

秘

或發渴咳嗽睡中驚

調平養安養之令其裏突如面赤

叫小便赤澀則可用前諸藥解利之今人見解利可治餘毒不

問虛突便解利之遂為虛弱者害亦不可不知也

○瘡疹後發搐

素問云瘡瘍煩燥痛痒驚悸善笑此心火五臟蘊熱毒成瘡

疹熱則生風當其未出心火生肝風今見發搐今瘡疹既出之

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

後又發搐者是餘毒未解熱積停蘊不能消散故動肝風而發

插也宜以道赤散化毒丹消毒飲柴胡湯三白散之類散熱退風而已或瘡疹復飲食暴復未能損熱食蒸發插者宜以紫霜丸服之其證必頭熱肚熱是傷倉證也又有瘡疹後再作瘡疹者亦輕此亦餘毒未盡皆失解利之故瘡疹之出後豈可不解利解利者當隨虛實而用藥也後人見瘡疹後解利餘毒一列妄投以藥或虛者反為大害不可不知氣虛者不渴面青飲食少大便不秘肌体瘦无力皆虛證也有此證者未可解利也又詳有瘡疹證而瘡疹未出而發插者用藥不可太冷恐為瘡疹之後害瘡疹已出後發插者此熱甚也故宜用化毒丹大青膏諸插藥無害蓋無瘡疹之悔矣若能詳審而調理皆獲安愈因而具述以廣其傳

○瘡疹愈後忽遍身青色或黑色手足厥冷口噤如瘡此名中地風也小兒瘡疹方愈藥劑尚弱餘毒水解忽身或青

或黑色手足厥冷口噤涎稠甚者手足微搐此由四時五行節令氣交有風雨寒暑地氣暴至小兒瘡疹方愈榮衛已弱被地風所吹毒氣乘虛而入故生是疾也宜用和濟方消風散二錢入蟬蛻末二錢分作三服生薑薄荷汁酒各數點溫湯侵服二三服即立醒矣隨時少汗而解或出瘡疹或再出結疹而愈此乃京師醫官宋鑑用此無不愈者後傳於此方用之

○瘡疹已出狂叫喘呼

瘡疹已出者熱毒自裏而達於外狂叫喘呼者臟腑熱燥而無津液也夫腎水常欲升心火歛而降今五臟皆熱瘡疹既出津液外泄臟腑乾涸無陰氣以守之則陽毒燥於上故狂叫喘呼宜服犀角地黃湯玳瑁散甘草散麻黃散主之更看大小便何部不利利之必愈

○猪尾膏證

虛汗實汗皆汗也。虛熱實熱皆熱也。是以瘡疹倒靨者。雖有實方論皆稱倒靨而已。不可分而辨正之。是以瘡疽始發。或斑或血疱。未結痂死之際。或因久不食。或因自利。或感寒邪。或寒不能運行榮衛。至不能出者。瘡疹雖多。量厥黑則出矣。猪尾膏使心既通。榮衛將復。則氣和神甦。瘡疹自結痂死矣。夫蘊毒作斑點。斑點作血疱。血疱如豆。起於肌皮之上。名曰疽瘡。既作血疱。血疱作膿。疱膿結痂死而愈。今作血疱而日數當結膿。窠而不結膿。窠者是毒氣尚可復入於裏。古人處方心涼熱毒氣不能復侵於心也。毒在肌膚則無慮矣。以此觀之。瘡疽至血疱是毒已盡在外也。後用猪尾膏。則毒氣不能復入也。今有醫者及病家見斑點或見血疱出遲。便用猪尾膏。殊不知毒氣未出盡而心胃寒涼。毒氣不能出。候人者多矣。猪尾膏是毒氣未出盡未結膿。窠者熱氣與血相搏。尚可同榮衛出入週流。恐其毒氣

入裏而用之也又論小兒方書亦用腦子猪血等藥服之遂斑點出而愈者此言為害尤甚非瘡痘之藥也乃是治傷寒溫熱證危急用之熱散然後斑出而愈是治發斑者非治瘡疹之斑後人不為祖述以候傳悞而用之者可恠矣

○貴賤不同用藥亦異

貴賤不同形志有異士貴之人形雖樂而志苦動履關心所稟多虛末三日天晴而中暑心間未陰雨則寒嗅荊芥薄荷而腹痛服桂附乳而宜溫之蓋皆裏寒不能運行榮衛故也又有瘡疹始發或斑或血疱未結茄疔時心煩狂燥氣喘妄無或見神鬼大小便秘腹脹渴而能食若毒氣發而黑色者此為實宜用猪尾膏奪命膏宣毒膏良方猪血虎腦膏皆可從漸而止退以知效為度常人不辨別虛實既用藥又不能撙節小熱遂以大涼藥治之熱疾未去冷病為害者多矣又有瘡疹自斑點結

血疱瘡六七日當結痂或六七日不結痂死者此是毒氣
盛實心火既燥熱毒內外貫注故令不結痂當此宜用猪尾
膏曾用之進一服隨時結痂神速特異以慈恩之人常遇天
氣節令寒暄不時脫着衣服以避寒溫必先呷冷水一二呷即
不感冒是心涼膜理秘而斂則風寒不能侵之也今瘡痘用猪
尾膏是心屬大而燥居於上焦又加之被蘊熱毒氣併於心臟
熱氣既盛則毒氣內外貫注古人用猪尾血乃以心血歸心用
左腦香以涼其心榮衛得香而行遇一則上心得血引左腦香
已行榮衛血疱始結膿聚膿血結痂餘證自退矣大抵用猪
尾膏之意豈不觀傷寒厥陰證土敗用承氣陽下之脾間
毒去脾土既和則水升火降寒熱作而大汗解不知其然此寫
貴之人常態也田野之人其形雖苦其志甚樂其神安所
多矣明蠶挂而熱發服橘而便秘其亡而不知其憂由

野之人常態也雖勿裨霜露中向日不知霜露之寒此皆素習以為常態也是以醫者當察富貴貧賤之不同用藥必異不可一藥而治也

○防用藥之失

前輩言治老人之病當先助火蓋老人者自然陰盛而陽微謂不欲見其虛而治其虛預以溫之治小兒則曰當先瀉大為小兒自然陽盛而陰微預以寒導引以平為期不至生熱也此治之大畧也若老而實幼而虛此為當隨時變通不可執於一曲也又曰五實當瀉五虛當補何謂五實身熱脉大大小便不利無汗為實有此證者下之愈何謂五虛身冷皮冷大便利汗出為五虛溫之愈又曰用利藥候大小便秘而利利之愈用溫藥者候大小便利而溫之愈二者合利而利合溫而溫也又有外證合利大小便已自利何必利外證合溫大小便已秘何必

溫大抵治病最難陰陽偏絕則無能救藥善用藥者但令陰陽不偏則人不死也故因而知又有熱瀉冷秘之辨此好事者必言之則終是不同熱瀉者渴水心煩小便赤手掌心出汗宜利小便冷秘者不能食膏滿吐清涎面青瘦而不能食者冷秘也其證少又非暴病不可不知

○病證未分所用藥

病有外同而內異又有病中遇天氣寒暑燥濕不同感異氣者又有病中喜怒哀樂不節病變異不常書中無名者仲景之目不了了不和是也目睛不了醫未識其證也了睛不和用藥不中其病此外同而內異也大抵治病多調適寒溫治熱熱去而不冷治冷去而不熱陰不虧而陽不損無不愈者治風以治風藥治冷以寒藥治勞治氣無非同治勞治氣藥後人不能究其病之源流緊要一槩用四均子陽參苓之類藥性

溫平為不能知病之由欲遂其差候殊不知縱令病勢弥漫卒不能救候入者多不可不知要之用和緩之藥各從其類而口緩但不致剛烈爾且防風白朮治漏風川芎當歸治血風川芎荊芥治頭風獨活羌活治高風天雄附子治虛風乾薑細辛治寒風大黃荊芥治熱風木瓜天麻治筋風各隨虛實寒熱而治之何嘗治風而不用風藥治冷而不用冷藥但令病去而不生他證為妙也

○瘡疹後觀虛實而解利

稟受有虛實病後亦有虛實安得一槩而論且瘡疹病後須解利之解利須觀虛實而用藥也且小兒稟受既實平時熱衛不壯瘡疹後須觀熱氣淺深熱者必大便難咽乾作渴而赤而須小便或赤有熱證者方可解利大段熱甚者以大黃散胃有餘毒嘔吐口赤有瘡或下利黃赤黃連散主之煩喘而小便不利

痘心湯餘熱溫壯齒齦宣腫牙疹不能嚼物面赤而黃或煩苛
露飲手槐花散肝臟餘毒不解叫怒不能睡卧者調肝散疹疹
出而恐入目爭心散出後餘毒未退渴水仍下血疹癰牛黃手
散黃耆散痘癰終發者小柴胡湯犀角地黃湯為良今絕見病
瘡疹當解利不問虛實便乃解利候投涼劑者多蓋解利是治
其有餘毒者用之瘡疹後無熱毒者但當隨宜安養之又有稟
受怯若因天氣不常冬溫邪熱遂成瘡痘瘡痘既出榮衛為班
為血疱為膿血為痧疔其榮衛大虛坐立戰搖大便不秘小便
不赤身無諸熱證宜用胃安散七寶散雙和散之類安養之候
其乳食如故不畏風寒肌膚稍實而少少以解利藥無害常
見瘡疹不問虛實便解利之或為寒中或為下利生而多端故
因而及之

論藥方

○預截熱毒第一

初生服生地黄汁仲景云孩兒初生下時宜進生地黄汁點
在我兒口中即下黑屎至壯年亦不害瘡疹

二冬溫服生油劑葡萄云小兒臟腑伏於熱毒未成瘡疹疾候
四肢微覺有熱食物似減頭髮乾立或時額多微熱宜服
生油劑方

右用生油一小盞似入鉢溫熱水一小盞旋旋傾熱水一
小盞入油盞內不住手以杖子打攪直俟入盞熱水更打
令均如蜜即止夜卧時三歲前至百日及一晝內每服二
蜆殼五歲至七歲每服三蜆殼十五歲以前至十五歲服
三蜆殼至半合直至大人每服一合至二合量大小增減
與服之服後良久令卧少時服三五服六小便利四肢熱

退瘡痘不生也萬金方云福壽論可先服以油劑服之行
解四肢熱極或瘡痘已出不可以油劑服但服和平藥療
於肝臟解其大熱慮熱毒太盛

三冬溫服三豆飲子大凡有時行瘟毒天行瘡痘者宜預服之

赤小豆

黑豆

菽豆各半

升早一兩

右用水九升煮候豆熟為度逐日空心任意飲之七日後
瘡必發快龍氏云冬月溫暖小兒輩必發瘡痘宜預服三
豆飲子以解之

四欲不患瘡疹服葛根汁治時行瘟毒瘡痘正發欲不患瘡疹
者預煎汁入酒以飲之則解之累用甚應本草云齒味苦
寒治一切瘡毒又治一切血病月經不止腸風痔瘡排膿
治瘡癰疽血撲服瘀血皆宜服之

五覺溫壯熱服葛根散夫行熱氣欲發痘瘡作熱疾者宜服解

肌出汗

葛根

蘇黃各一

石膏二兩

更苓

芍藥

桂枝

甘草各半

右為齏末每服四錢水一盞煎至半盞溫服取少汗出若
先自汗者即去麻黃

六樺皮湯治傷寒時氣腕豆瘡毒

右用樺皮木剉煎溫服取安樺皮味苦平無毒治肌熱黃
疸治時燼熱熱毒瘡今腕豆是也及治乳癰初作腫硬欲
治癰腫其治瘡痘可知

七必勝散治瘡疱出未能勻逼此藥透肌解毒或不利其瘡毒
已先發者宜解毒服之

右以牛旁子不限多少炒令熟杵為細末每服一錢入荆
芥二穗水一盞同煎至四分放溫與服如瘡疹已出更與

服充妙牛旁子本草云癰未破者服一枚能出癰疽頭故
出而未透勻者宜用之又云通十二經脉十二經脉既通
毒氣出齊無阻矣

八涼驚丸治瘡疹五勝皆見木勝土木歸心故預防發癰者

龍膽草

防風各末

青黛分七

鈞藤分七

牛黃

麝香各末

黃連分七

龍腦分七

右同研細末麪糊為丸如粟米大每服三五丸至一二十
丸煎金銀湯送下溫服

九枯蕒散治斑生於心心生熱熱則生風風屬肝二臟相搏風
火相爭故發搐也治之當瀉心肝補其母宜用之

括蕒根末

白甘遂末各

右同慢火炒焦黃研勻每服一字煎麝香薄荷湯調下

無時服

○無疑似解利第二

十升麻湯治大人小兒時氣瘟疫頭痛足令脉數發熱腹脹
寒及瘡疹疑貳之間並宜服之或未經解利而瘡毒已發
又云證候未全或未明者但可與解散之也又云患瘡疹
大便自如常者亦可服升麻湯蓋用升麻其性苦寒無毒
主解百毒殺鬼邪辟瘟疫蟲毒中惡腹痛咽喉口瘡皆毒
也瘡痘亦毒故也其次用葛根性平治消渴大熱解肌發
表出汗開腠理治頭痛升麻葛根二藥皆治伏熱毒動心
恍惚驚悸煩燥大抵瘡疹是蘊熱毒葛根解熱升麻去毒
也病熱而藥性微寒冷熱相攻則為藥治時行寒熱又法
血痺使瘡痘易出也又利小便瘡疹有文熱者則利小便
也次有甘草調和之况新書言瘡疹渴燥甚者亦用炙草
散主之四者解毒治熱調榮衛為治瘡疹之要藥也為真

疑貳之間非瘡疹伏熱而發熱者有傷寒傷風傷食驚證
無患瘡疹而稟氣怯者皆發虛熱而非實熱若服之是瘡
疹者則毒熾而愈他證者及以為害不能盡述其由但有
壯熱而面青目白睛不黃赤大便不秘小便清者皆不可
服裏無蘊熱故也此藥治未發瘡疹之前瘡疹已愈之後
服之消毒故也非正出時服

升麻

芎藭

芍藥

甘草等分

右為齋末每服二錢水一盞同煎至半盞去滓溫服不拘
時候亦可為細末湯調服身心煩熱即溫服寒多即熱服
十一惺惺散治數證皆為純陽人所用古人處為小兒藥非乃
裏寒者可服且以藥對其證用之意大抵渾身止熱必由
風熱瘡疹傷寒時氣且先與之也其頭痛目眩并流清涕
者用細辛喘逆者用桔梗人參多睡者用茯苓恐傷寒時

氣乘裏弱者用白朮也治風熱瘡疹括萎根也括萎味苦寒治身熱煩滿大熱除腸胃中痼熱八疸面黃煩渴前用永止小便利熱而育痺不下乳陽證傷寒治痼下等症其熱也故非裏寒者可用其裏寒者由身有大壯熱不渴而大便反利小便不赤面青目白睛不黃赤皆裏寒證也其中雖有白朮以溫終非為虛熱者用人之臟腑寒則寒藥先効熱藥未必能制之臟腑熱則熱藥先効寒藥不能制之此勢之自然也豈得不辨表裏冷熱而用藥也和劑方小兒傷寒壯熱當先服此大効次服羌活散如壯熱未退切不可與通利大便及涼藥恐是瘡疹服藥則誤也

苦括梗

細辛

去葉

人參

甘草

炒

白茯苓

括萎根

白朮

各一兩半

右為細末每服一錢水一盞八薄荷二葉同煎至三分去

相溫服要知氣入薑煎不拘時候身雖壯熱大便自利者不可服

十二荊芥散治麻痘子無瘰癧或癰疹大便自過

右用荊芥少許爛研以新井水將布帛裂過入一滴許麻油打勻令飲之便不亂悶麻豆已出用黃蠟煎青膠水飲即安青膠水乃牛皮膠也荊芥治血風麻子是疹子常言風癢癰疹則皆出皮膚其毒輕而浮又以麻油打勻此滑竅之理又以黃蠟煎青膠水服則安此滋血行榮衛榮衛既順麻疹出矣指迷方荊芥湯乃消毒飲加薄荷煎服之

十三羌活散解熱散毒治風壅欲作瘡痘者

羌活

獨活

川芎

桔梗

蟬退

前胡

柴胡

地骨皮

甘草

括婁

天麻

荊芥

防風各等分

右為細末每服一錢水三分盞薄苛三葉盞內亦至二
通口服量火小加減藥水此藥詳其藥味治風治身治驚
下痰涼脾治血熱透肌但實熱發無汗不治如稟受怯弱
或脾胃弱或外熱目白睛青色皆裏無熱不可輕用
十四奪命散治瘡疹已發未發並宜服之

升麻

糯米

紫草

甘草半斤

木通二錢

右劉為散每服一大錢水七分煎四分去滓溫服出瘡疹
熱毒勢甚者服解蘊熱利小便瘡痘初發氣盛亦宜服
十五牛旁散涼風解毒

右用牛旁子炒為末水煎一盞服之小兒冬月有非節之
暖及春月天氣暄暖或甘肥之過或重衣溫厚幃帳周密

傷皮膚害血脈瘡瘍發黃是生多疾宜預常服之也

十六葛根橘皮湯治冬溫未即病春被積寒所折不得發至夏
熱得其寒解冬溫始發肌肉斑爛癰疹如錦紋而咳心悶
但嘔吐清汁服此

葛根

橘皮去白

杏仁去皮

知母

黃芩

麻黃去節

甘草炙

右件劉散等分每服抄三錢用水一盞同煎半盞去粗溫
服不拘時候

十七薄荷散方小兒總覺是瘡疹宜服之

薄荷葉一兩

麻黃去節

甘草炙

右為細末每服二錢水一中盞棗二枚生薑三片同煎至
六分去粗攷溫日三兩次服此是小兒稟受雍和毒氣甚
者宜服之蓋此方云小兒總覺是疹痘便服之服之而汗

出者服調中散服薄荷散若作寒熱厥反遲者選脫齒散以溫之詳其理非下藥之法也實者服之未必安虛者以之必危殆

○熱甚生風者第三

十八獨勝散治小兒發瘡痘早微熱晚大熱目黃腸動身熱手冷發甚如驚者又名牛旁傳蚤散

牛旁子

半兩

白僵蚕

一分

右為麤末每服一大錢水六分盞紫草二七寸同煎至四分盞連進三服其痘便出此藥用牛旁子出癰透肌白僵蚕治遍身癰疹疼痛成瘡為末酒調服之立瘥又以紫草煎之令利竅是瘡疹證無虛寒證者服之立出也

十九抱龍丸治小兒一切風熱中暑驚悸瘡疹欲出多睡咳嗽痰盛面赤手足冷發溫壯睡中驚搐搦不寧脉洪數頭痛

南星

利開裏白者為末用臘月黃牛膽汁

天竺黃二兩

朱砂

二錢研雄黃半兩

麝香一錢

牛黃一字

右同研極細滴水和丸如鷄頭實大每服二歲見竹葉薄

荷湯化下一丸不拘時候錢氏云因驚而生熱用藥發散

熱入於表故表熱不退而生斑宜服之有大熱者利小便

有小熱者宜解毒其出快勿表勿下宜服袍龍丸

紫草膏治麻痘不快

紫草

白附子各一錢

麻黃去節

甘草各二錢

全蝎十箇

僵蚕二箇炒

右件為末用蜜一兩酒半盞入紫草煎數沸後令旋旋同

和前藥丸如皂角子大每服一粒用紫草煎湯化下前用

黃芩散調治詳之本草云無毒治病十去其十止等藥

也猶如紫草膏治瘡痘兼此藥治驚癇風疾又治瘡疔出

不快如瘡疹所作之初似傷寒傷風驚風瘡疹疑貳之間
與服之皆有主治不至敗事可與上等藥同矣時家常備
之為妙

○感冒風寒與瘡疹相雜者第四

二十紅綿散一名天麻散治傷寒及痘疹

天麻

荆芥 各一分 甘草 炙

麻黃 去節各二錢

全蝎 七箇金者

右為末令勻每服一錢水半盞薄荷二三葉酒四五滴煎
二三沸帶熱服之如疹子未出再進一服相次又進一服
若是傷風服亦不妨此藥大抵為解表之藥也治身有六
熱面赤氣鬱無汗者為表未解也可服之蓋此藥以天麻
麻黃為主治也有汗不得服麻黃者其腠理已疎開不宜
更發汗也如有熱更有汗者則惺惺散為和解之藥也故

仲景論表證有發汗者有和解者有調和榮衛者今有汗者不可服麻黃則和解藥為可用如更有虛寒證者又止宜調榮衛也如和散之類是也論此藥能治瘡疹者豈芥主寒熱鼠癰瘰癧生瘡下瘀血天麻治諸毒惡氣皮膚壅滿熱毒癰腫蝎治諸風癰疹筋脉諸風小兒驚風其并芥天麻蝎三味皆性平治瘡理血故宜瘡瘡所服也

二十一五積散治傷寒寒疫內傷生冷者所服也瘡痘才蘊熱毒小兒熱盛洵則飲冷熱則當風反被風寒所伏寒熱相搏面青發熱心煩自利者宜以此藥散其內外寒毒然後熱氣上行或汗或瘡痘或癰疹服之而愈矣

方見寒門

二十二麻黃湯治瘡疹煩喘甚者主之

麻黃

去節

杏仁

去皮尖

甘草炙

桑白皮

蜜炙

右坐為散每藥一錢用水七分盞同煎至四分盞去粗出服之若脉數有熱未退者入竹瀝少許咽喉病或嗽者煎熟入麝香少許服之

○調平瘡疹用之第五

二十三紫草飲子治小兒初覺不安辨證候有瘡疹證三四日隱又在肌膚而未出者及瘡出而遲亦宜當與服蓋紫草者能利竅則瘡痘易出也通水道去心腹邪氣則以除積蓄之熱臟腑自安也

右用紫草二兩細剉以百沸湯一大盞沃以物合定勿令紫草氣出量兒大小溫溫服之雖瘡子出亦當輕爾

二十四髮灰飲治斑瘡豌豆

右用頭髮燒灰令存性飲調服之古方以亂髮治丁腫骨疽治孩兒熱瘡癰熱諸般血疔種驗髮本血之餘今治諸

血瘡證從其類也

二十五牛旁甘草散治麻豆初作服此即稀

牛旁子

義妙

甘草

炙一錢

右為細末每服一字或二字薑葉煎湯調服之不拘時供

二十六兔肉醬去小兒豌豆瘡

右用兔肉臘月者作醬食去豌豆瘡無膿兔毛煎湯洗脫
豆瘡及兔毛傳良其兔腦主凍瘡骨節磨傳父疥兔毛灰
主炙瘡兔頭皮主鬼疰毒氣在皮膚如針刺者又云主鼠
瘻以兔腦兔骨兔頭皮兔毛已上主治此之皆治皮膚瘡
瘍故藥性論云兔肉平寒作醬去豌豆瘡涼血故也蓋兔肉
多食則令人色痿損陽事絕血脉此亦涼血散熱故也

二十七安斑散調理瘡瘡

升麻

赤茯苓

白

羌活

黃芪

人參

桔梗

枳殼

甘草

右為細末每服一錢水七分盞紫草薄荷少許同煎至四分盞去粗放溫服之量兒大小增減此藥為解毒涼血生肌寬腸導熱利小便快膈之藥也患瘡疹有熱無寒者可服之

二十八蘿蔔湯治斑疹瘡出不快者

右用開花蘿蔔煎汁時時與飲之張氏云瘡疹氣勻即出快尋諸本草蘿蔔主治嗽定喘下氣消脹解毒解渴解熱毒詳之皆勻氣解毒消壅則瘡疹然勻快矣此氣勻即出快之意開花蘿蔔取欲出之義爾

二十九紅子湯平調瘡疹

紅花子

紫草

枳殼

升麻

右為細末每服半錢煎薄荷湯入酒一滴同調下此藥用

麻黃表毒氣令出升麻解蘊毒茶草滑竅也內紅花子本草云治天行瘡子不出者吞數顆即出故用之

三十快斑散調瘡疹

貫衆

赤芍藥各一

甘草炙

升麻

枳殼

各半兩

右為細末每服一錢水一盞竹葉七片同煎至五分盞去祖溫服量大小與之此藥內貫衆主腹中諸熱邪毒其味微寒故也患瘡痘煩渴咽燥喘急大便秘小便赤口乾目赤皆裏熱也宜服之如無裏熱證則與藥不相當反為之害若當服而不服斯害也已可不審之

三十一甘草散治瘡子未出及雖出燥渴者宜服

右用大甘草不以多少炙過為末每服一錢或二錢水一盞煎至六分盞去滓溫服不拘時候呷之以少解利熱毒

卽住若瘡出遲當常服紫草飲手方見瘡疹初出門大人
當針兩腕硯子骨間男左女右取之或灸一壯亦助發疹
瘡毒氣已發不必用

三十二紫草如聖散瘡疹初出急服方輒乳嬰兒與乳母兼服
之四五歲已外只令兒服之

紫草 二兩

陳皮 去白一兩

右為細末每服一錢水一小盞入葱白三寸煎至五分盞
去粗溫服量兒大小與服如選方云瘡疹熱勻即出快紫
草滑竅去心腹邪氣陳橘皮快氣葱白發散而開泄腠理
也

三十三化毒湯治瘡疹已出未出並可服之

紫草

升麻

甘草 各半兩

右件如麻豆大水二盞糯米五十粒煎至一盞去滓放溫

分作數服劉氏傳云豉豆豉欲出渾身壯熱不思飲食若服此一服即內消已有一兩顆出即解其半若令出即當目頭焦只三服瘥詳其前人處方豉與化毒之名至於主治之證無不切要但看人臨時用之何如爾且瘡疹病無他病相兼無不愈也又在人稟受虛實不同冬夏各異又乘異氣所得之由風寒食驚不一當隨時而酌安養之又如仲景治傷風云正患傷寒如其人有故疾者發動則無以故疾藥攻之活人書云治傷寒云病中又感異氣者乃時令寒暑燥濕風不節脉息與少陽相異證候與傷寒不同者當隨宜以法治之不可泥於一曲也此藥化毒但能化實熱之毒若稟虛而時熱而伏冷者皆當調適以平為期

白茯苓

人參

紫河車

甘草

炙

右件各等分為細末每服二錢水一盞生薑二片棗二枚同煎至六分去滓溫服作兩三次服

三十五紫草木通湯治小兒瘡疹

木通

紫草

人參

茯苓

糯米

甘草

炙

右為糞末每抄四錢水一盞半煎至一盞去粗放溫分二三服小兒瘡痘熱甚則山熱心主之熱甚則小便赤澀其熱蘊蓄而生病此藥利心火以燥脾土心清則不生他疾脾平五臟自安也木通導心火糯米歸脾土也三十六如聖湯治小兒瘡疹毒攻咽喉腫痛

桔梗

甘草

牛蒡子

麥門冬

炙

右為細末每服二錢沸湯點細呷服入竹葉煎尤妙

汲方同以牛蒡子為惡實蓋異名也

三十七蟬退甘草湯發小兒斑痧

大蟬退

二十一箇云足

甘草半一錢

右用水半碗煎至一小盞旋旋與服効已用驗

三十八紫章枳殼湯治瘡子出不快倒靨

紫章

木通

甘草炙

枳殼炙炒

右等分為菴末每服二錢水一小盞煎至半盞去滓溫服
大抵壅聚則榮衛不行令出不快則倒靨用枳殼寬大腸
木通利小腸紫章消竅治心腹蘊蓄邪氣皆易出也大小
便秘澀者無不可用

三十九當歸散治小兒初得病兩目驚狂身熱汗出問之不增寒
不惡風脉洪數者當下之如以寬得有此證瘡痘未發之
前宜服當歸散

當歸一兩 甘草一錢

右爲細末每服二錢水一中盞豆豉十粒同煎至半盞去
滓量兒大小服以利爲度逐日冷與甘草汁三歲已下一
歲已上加減服之

四十快毒丹治小兒瘡疹氣勻即出快蓋血與氣相隨若內有
邪熱即血妄行使氣不勻大抵瘡疹氣快自勻宜快毒丹
瘡疹出皆宜服之

牽牛黑者妙 木香已上各一分 肉苳蔻半兩 青皮生一兩半熟

右件搗羅爲細末滴水和丸如黍米大每服七粒至十粒
濃煎紫草葱白湯下乳前服之量太 減

○防備薰沐用之第六

四十一胡荽酒治小兒初覺不安辨證是瘡疹或已發未發以
出而快者用之蓋瘡瘍煩燥瘰癧皆出於心胡荽味辛能

通心竅胡以胡荽酒煎噴之立出心主瘡瘍主煩燥主痛
痒主驚悸凡為瘡疹數證必備是胡荽能通心竅而通之
則瘡疹易出也若辨證是瘡疹而大便利者紫草胡荽二
藥皆未可用恐紫草性寒胡荽利大腸故也則宜先溫之
臟腑如常瘡疹證未退者宜用之

右用胡荽三兩細切以酒二大盞煎令沸沃胡荽便以物
合定不令氣出候冷去滓微微從頂以下塗兒面頰眼目
之間噴背脊及兩脚胸腹令遍勿噴於面錢氏用好酒二
盞煎一兩沸入胡荽四兩再煎又云病人左右上下常令
有胡荽氣即令辟去汗氣惡氣瘡疹出快忌外人及穢觸
之物雖不可受風冷然亦不可壅遏常令衣服得中并盥
涼處坐卧

四十二葡萄酒治時氣發瘡疹不出者

右以葡萄研酒飲之葡萄味甘平利小便取穗出快之義也

四十三燒赤木猪甲

景仲謂瘡疹未出之間宜於房室燒赤木木也猪甲二物辟惡氣父母常戒其色慾亦令人守房室門戶勿令外人入房恐觸犯令小兒瘡疹難出或有觸犯得上喘面青黃色者猶輕因此犯而死者不可勝數宜謹之

四十四燒乳香薰瘡疹法

如瘡疹正發則忌諸臭穢惡氣以逆榮衛恐陷伏倒靨也於房室中常令燒乳香不絕可去惡氣瘡疹無不効者四十五黃土末傳瘡疹已出者不可發表如又表之者更增斑爛若發膿痛甚者即用乾淨黃土羅為細末傳之仍數匕食蜜為妙

四十六羊硝猪膽汁如瘡斑爛爲不合表之太過一手一足面
腦腹背皆各爲一片瘡相似令人不忍觀之者

用羊硝猪膽汁調塗瘡上勿令動看直候瘡落有大段
瘡發不通卧席者用麥麩簾卧將息爲妙

四十七黑牛糞燒灰貼瘡疹治已出而未平切忌見雜人恐勞
力之人及狐臭薰觸故也未愈不可當風當風則成瘡斑
也如膿疱出可煨墨牛糞貼之令速愈而無癰痕也

四十八黃蘗膏小兒瘡疽出後即須愛護面目勿令沾染欲用
胡荽酒噴時先用此方塗面上然後噴四肢大人嬰孩有
此悉宜用之

黃蘗

一兩

萊豆

一兩

甘草

四兩

右件搗羅爲末再研令細後以生麻油調如薄膏從耳前
眼唇並手足塗三五遍上塗面後可用胡荽酒噴也早用此

大塗面上令不生疹痘也如用此方塗遲縱有疹痘亦少
諸家方愛護面目者皆以此方治療分兩用法皆同惟疹
痘論一料用蕺豆粉三兩伍錢

四十九白芥子散治小兒患瘡疹令不入眼

右用白芥子為末水調傅脚心則瘡不入目矣

五十爛肉汁治豌豆瘡

右用爛肉汁洗之乾肺亦得

○微表而欲散第七

五十一蟬蛻散治瘡疹漸作身熱似傷寒只耳尖脚稍冷或腹
痛大便秘者是瘡疹

右用蟬蛻二十一箇洗去泥為末水一盞慢火煎至半盞
去滓量兒大小溫服之如覺瘡疹已出便依前服三五次
不是瘡疹亦無害小兒瘡疹欲發出加甘草一錢半煎一

盡旋旋與服累効小兒伏所蘊積熱毒蟬蛻味鹹寒可以
制况有暴感風作熱客於表者蟬蛻亦治風毒充於皮膚
癢痒不止驚癇夜啼癲疾寒熱驚悸皆宜服之

五十二猴梨酒治瘡痘出不快

猴梨子

五箇又名山果子

右月酒煎入水便服之瘡痘即出

五十三麻黃紫草湯治瘡子不出

麻黃

去節

人參

各一分

杏仁

七枚去皮

右為籠末每服二錢水二盞用紫草五寸同煎至一盞去
滓分為三四服分作二日服未可服諸藥

五十四水鮮散治瘡疹出不快煩燥不得眠者或出而身體尚
有熱者

大黃

黃芩

桂心

甘草炙

芍藥

二 麻黃

去節 四兩

右為末患者以生熟湯浴訖煖水調下二錢相次二服得汗利便差強實人服二方寸匕調風實之人三伏中亦宜用之若去大黃則春夏通用之凡人飲酒食瓜果多以生熟湯浸身皆為酒及瓜氣味以此觀之先用此浴身亦出其毒矣

五十五玄參升麻湯治傷風傷寒風熱驚食等熱運於肌或汗或下後毒氣不散表虛裏實熱發於外故身斑如錦紋其則煩燥譫語兼治喉閉腫痛

玄參

升麻

甘草 炙等分

右剉如麻豆大每杓三錢水一小盞同煎至半盞去粗溫服不拘時候

五十六麻黃黃芩湯治瘡疹出不快煩燥不得眠

麻黃

去節一兩

黃芩

赤芍藥

各半甘草炙

官桂

去皮各一分

右為細末每服二錢煖水調服日三服兼治天行熱氣出
跳豆瘡不快蓋煩燥昏憤或出尚身熱疼者
五十七升麻黃芩湯治瘡疹出不快煩燥不得眠

升麻

黃芩

乾葛

芍藥

甘草

炙各錢半

右剉如麻豆大每服二錢水一中盞煎至六分去滓溫服
若時行瘡疹出不快煩燥不眠者加水香一錢半
五十八葛根散治天行熱氣欲發瘡痘作熱甚疼者宜服解肌
出汗

葛根

麻黃

各一兩

石膏

二兩

黃芩

芍藥

桂枝

甘草

各半

右爲龜末每服四錢水一盞煎至半盞去滓用酒下初服候自出汗者去麻黃

○微下而目消第八

五十九四順散患瘡疹至四五日不大便瘡子又盛出却喘龜氣急腹脹小便赤澁須用此方

大黃

升草炙

芍藥

當歸各等分

右爲龜末每服抄三錢水一盞煎至六分去粗溫尿不拘時候若得氣通不喘腹不脹便休與此藥若初覺有赤點子大便如常小便赤澁須用藥通大便要出快也若出得色紅而快更不須通也

六十利毒丸治小兒瘡疹欲出胃熱發溫壯氣龜滿大小便赤澁眠中驚煩渴口舌乾手足微冷多睡時嗽涎實脉沉大滑數便宜服之

大黃半兩

膩粉

六青路一

龍腦

朱砂各半

檳榔

生牽牛

青黛各半

青黛各半

右爲細末麴糊爲丸如黃米大二歲小兒服八九生薑水

水下不動再服量兒大小虛實加減

六十一夾食者紫霜丸治頭疼壯熱脹爲夾食

方見和劑方

○瘡疹出太盛解毒第九

六十二消毒散治瘡疹已出未能勻透毒氣壅遏出不作壯熱

狂燥咽膈壅塞睡卧不安大便秘澀及治大人小兒上膈

壅熱咽喉腫痛胸膈不利治遺傳胎毒及治大人小兒上膈

牛蒡子各一兩

甘草二兩

荆芥一兩

右爲龍末每服一錢水七分薑煎至四分去滓食後臨卧

服之此藥治大便秘澀是治裏熱故也况本草云惡實味辛平其中治證治風腫治暴殮熱肉生風解丹石毒治咽喉四肢風腫此性稍涼也為瘡疹所宜服者能透肌出毒瘡是以瘡疹亦出也大便利則不可服

六十三化斑散

石膏

用紙裹炮令脆為末或用
瓦礫之類燒去火毒

右件等分用熱水調下一字服之或調塗唇上去頂痛除
昏發泄瘡子此名石膏知母化毒散治小兒瘡斑此二方
極妙後方恐大涼

六十四地黃雄黃飲治溫毒發斑瘡痘出不快者乃冬應寒反
熱或被積寒暴發熱毒不得宣泄令身斑如錦紋心悶而
咳但嘔清汁者葛根橘皮湯地黃雄黃飲子

地黃

淡豆豉

各四兩

右以猪脂一斤和勻露一宿煎三分減去一分去滓下雄黃末一錢麝香半錢攪勻量兒大小飲若太多反有所損六十五羣角散治小兒瘡疹不惡寒但煩燥小便赤澁多渴或赤斑點者

犀角 鎊 甘草 炙各半兩 防風 二兩 黃芩 半兩

右為籠末每服抄三錢水一盞煎至七分去粗溫服不拘時候

六十六紫河車散治小兒斑瘡毒氣不解攻咽喉者聲音不出舌煩生瘡遇逆煩悶潮熱面赤

紫河車 茜根 黃蘗 各三錢 芍藥

甘草 炙各半兩

右為籠末每服一錢水七分盞生薑一片同煎至四分去滓溫服一方用牛蒡子

六十七玳瑁湯治時行止瘡及赤瘡疹子未發者令內消已

發者解利毒氣令不不盛

生玳瑁生犀
治時行水瀉

右同攪令勻每服半小微溫服一日四五服為佳又治出

而未快者宜服之又云毒氣內攻紫黑色出不快用玳瑁

水磨濃汁一合入獺猪心血一皂子大以紫草濃煎湯都

作一服服之玳瑁犀角其性微寒以治熱毒則知其無失

也二藥皆治瘟瘵蟲毒解百毒通血脈消癰腫故用之以

解蘊毒可宜服也

六十八白虎湯治小兒痘疱熱瘡斑瘡赤黑出不快及瘡毒餘

熱并溫熱病暑中氣煩燥熱渴大便秘小便赤四時天氣

大熱即可與服如冬無大寒天氣大溫即可服之

石膏四兩 知母半一兩 甘草三 人參半兩

右為養末每服抄三錢水一小盞粳米二十粒同煎至半
盞去粗溫服不拘時候此藥治中暑又患瘡痘天氣大熱
與肌熱心熱相應煩燥狂亂渴水發黃鼻衄吐血便血淋
秘皆可服之指迷方治瘡疹夏月煩燥加麥門冬用竹葉
煎一名竹葉湯

六十九人參竹葉湯治夏月壯熱煩燥心悶口乾渴心神不寧
痰壅嘔逆熱治瘡疹後餘毒熱不退小便赤澀成赤斑者

人參

半夏

湯池洗

當歸

淡竹葉

天門冬去心

右五味等分為養末每服抄二錢用水一小盞生薑三片
同煎至半盞去滓溫服不拘時候瘡疹如覺不惡寒但煩
燥小便赤澀多渴成赤斑點者宜服之此藥治中暑虛煩
傷寒疹痘後餘熱不退皆宜服也

七十八初散治瘡疹毒氣少大小便利倒伏不出者

生地黄

地黃

珠砂

一兩

右為細末每服一兩煎胡荽酒少許同溫湯調下

七十一青黛散治瘡疹未作膿痛甚心煩燥睡卧不安者並

宜服之

右用波斯青黛如棗核大以水調服之一方用溫磨刀水

調服之

七十二野通散治瘡疹出不快并傷寒不語

乾野人糞

炭火煨

片腦

麝香

各少

右為細末每服一錢新汲水八蜜調下本草云乾野人糞

治蜘蛛咬瘡此治瘡疹出快明矣蓋蜘蛛咬瘡久而不愈

其絲生皮膚延蔓遍身不愈用椎黃青黛麝香水調以知

蛛試之蜘蛛化為水後果驗也椎黃青黛麝香是治瘡疹

常用之藥乾野人糞亦治瘡疹之藥野人乃彌猴也黃色
尾長面赤者若人家養者肉及屎皆不生成八其食忌雜
違其本真也

七十三無比散治瘡子惡候不快及黑瘡子應一切惡疾

硃砂

一分研

牛黃

片腦

麝香

膩粉

各一分研

石同研細如有患者小兒一字大人半錢水銀少許同小
豬猪尾上血三二酒新汲水少許同調服先寧穩得睡然
後取轉下如爛魚腸葡萄穗之類臭涎惡物便安小兒用
乳汁滴尤妙觀之此藥方思古人論證處方無有不効者
須是病染相主則一下咽而病云若不相主而用之下咽
即死也且傷寒有用硝石大黃而愈者有用附子乾薑硫
黃丹硫著艾而愈者此合用而用之也設若合用硝石大

黃却用硫黃附子薑桂合用硫附薑桂却用硝石大黃下咽即死矣此用無比散之意也無比散治瘡疽熱毒太盛壅瘀榮衛不行外不得泄而內不得通毒氣在裏外則瘡疹黑色裏則肢一喘急譫語大小便不通昏因者宜服之此有其毒則用其藥無不効者設或瘡黑脈裏無腹脹無喘急無譫語下大小便不通無昏因大便反如常或反利者則無比散不可用也常言對證用藥是也有一士大夫之家一子第八歲患瘡疹黑脈診胃脈大弱前醫用升麻湯羌活散問其胃弱之故言平時胃弱不能進食今瘡疹黑脈服升麻羌活散臟腑日夜數次後用溫臟腑藥更不止而卒服升麻羌活散愈臟腑不固而米穀不化當此見瘡黑不見其臟寒則無比散亦無如之何故下藥先審病之虛實寒熱豈可一槩見黑脈便投良劑豈不誤人生死

之計也

七十四豆湯治瘡瘻未作膿心膈燥睡不安者

右用黑豆煮汁徐徐溫服之亦解

七十五透肌散治瘡疥升方與三十三化毒湯同

七十六黃蓮散治瘡瘻毒氣上衝口舌有瘡下部亦有瘡有熱者亦服之

右用黃蓮一兩去鬚為末每服一錢水一盞煎至五分去粗不拘時服量大小虛實與服瘡瘻初發亦宜服之

七十七通關散治小兒斑痧水痘心悶煩燥發渴及小便赤澀口舌生瘡通心經利小便

山梔子

大黃

木通

甘草炙

車前子炒

瞿麥

茯苓

人參

滑石

地扁黃

石為細末每服一字二三能者十錢水半盞八分心同煎
至三分服稟受稍弱者五苓散人參白朮散亦得
七十八紫雪治大人小兒一切熱毒胃熱發斑消火應發疹及
傷寒熱入胃發斑并驚簡廷厥走馬急疳熱疳黃瘦咽痺
痛及瘡疹發毒攻咽喉水食不下者

黃金一百兩

寒水石

石膏各三斤

犀角

羚羊角各三兩

玄參

沉香

木香

丁香

甘草八兩

升麻六兩

右用水五斛煮金至三斛去金不用人諸藥再煎至一斛
濾去粗投上好芒硝二斤半微火煎以柳不莖攪勿停手
候欲凝入盆中更下研硃砂麝香各三兩急攪候勻冷貯
於蜜器中勿令見風每服一錢溫水化下小兒半錢一字
咽喉危急捻少許乾嚥之

七十九竹葉湯治小兒瘡疹不惡寒但煩燥小便赤澁多渴成赤斑點者宜服竹葉湯羣角散

石膏四兩

知母二兩

麥門冬

去心甘草

各一兩

右為糞末每服抄二錢水一盞竹葉一握同煎至半羹服之
脾胃服不拘時候

八十導赤散治瘡疹心經蘊熱睡臥不寧煩燥而小便不利面赤多渴小兒貪食乳者渴也

人參

木通

麥門冬

去心

生地黃

甘草炙

右等分為糞末每服抄二錢水一小盞煎至半盞去粗溫服不拘時候

八十一救生散治小兒瘡疹膿疱惡寒危困陷下黑色方此藥
治大段熱毒頓回八歲肺者不得已而用之

積血

服月內以新瓦瓶子內盛於當風處乾為末

馬牙

一研百合

珠砂

牛黃

片腦

麝香

各

右同研極細每服一字新汲水調下六便下惡物瘡斑紅色為度不過再服神驗無比

八十二 犀角湯治小兒痘疹及赤瘡子

犀角

大黃

桑白皮

蜜炙

釣藤

甘草

麻黃

去節各一兩

龍膽

半錢

石膏

芫花

黃芩

炙各半兩

右為瓮末每服一錢水一小盞煎至四分去滓溫服量兒

大小加減服瘡子退後濃磨犀角水塗之更良錢氏亦代

方同以此藥治瘰癧太盛令不入眼則名調肝散此藥

治風盛氣實心肝血熱津液內燥大便不通毒氣上盛表

熱未散之藥也且大黃芫花治已燥釣藤龍膽治風血熱

桑白皮石膏治上焦熱麻黃黃芩散肌熱犀角甘草解毒
熱大抵用藥貴於與病相主則病去而正氣自復苟為不
然則反為大害如犀角散自非大便秘數日不通喘急悶亂
煩燥譫語者豈可服之恐病藥不相主治也

八十三牛黃散治便血由瘡疹陽毒入胃便血致日夜無度腹
痛啼哭

牛黃一分 鬱金一兩

右為細末每服半錢以漿水半盞調至三分和滓溫服量
兒大小以此增減日二服

八十四玉露散治暑月山瘡疥煩燥熱渴

寒水石

秋而微青黑中有甘草一兩

方解石

堅白而有青壁手不可拆者吳無以石膏代之堅白似石青散之段段皆方者是半石

右同為細末每服一字或半錢一錢食後用溫湯調下

八十五羣角飲子解熱毒去風疹

羣角

甘草炙

防風二兩

黃芩一兩

右爲齏末每服五錢用水一小盞煎至半盞去粗溫服不拘時候

八十六羣角地黃湯治瘡疹出大盛者宜服之活人書云傷寒及瘟病應發汗而不發汗內有瘀血者及鼻衄吐血不盡內有餘瘀血而黃大便秘者此方主消化瘀血兼治瘡疹太盛者此方解之

羣角一兩

生地黃

半斤

芍藥三分

牡丹皮一兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煮取一盞有熱如狂者加黃芩二兩其人脉大來遲腹又滿自言滿者爲無熱不用黃芩

○毒氣壅聚倒靨黑色第十

八十七猪尾膏治瘡疹初作未能出透及已出盡內外熱毒貫注血疱如豆在於肌皮之上不結痂死二者皆用之且瘡疹蘊伏毒熱欲出而未能透則熱甚動心心煩狂躁妄語或見鬼神此皆心熱也蓋心榮於血血熱則瘡瘕則色敗未出者則為鬼瘡子一出而便黑也已出者為黑靨大能瘡痘自紅斑生成血疱疱至五七日結膿窠至六七日不結膿窠者此是毒氣彌滿恐復入裏古人用龍腦香涼心血行榮衛用猪心血者以心歸心用猪尾血者取其常動欲散外也况有前狂燥證而未省者以溫酒化下此意欲散而行榮衛故也皆治熱毒太盛者後人見用猪尾膏亦名龍腦膏得効間有虛而陷伏者亦用之誤人甚多深可恠也又有當用一字却用一少熱少而不能當之及以為害者亦多如今用一字者且與半字如傷寒作渴甚能飲

一斗者且與五升正此之意况有心經熱藥有他虛寒證見者又不可輕服如吐瀉人發熱煩渴小便赤則不全為寒證治也煩燥人大便自利而小便清則不全為熱證治也如有此證在醫者兩全之去其所苦扶和陰陽不至傷絕無不安者

右用九腦半字許研細旋滴猪心血和丸以紫草湯化下煩燥狂悶未省者以溫酒浸服之錢氏用猪尾膏用猪尾血其意皆通又名九腦膏

八控心散小兒斑瘡一服而出

全蝎

二十四

雄黃

麻黃

去節各一分

右為細末每服一錢用胡荽煎酒調下蝎治諸風癱瘓中風半身不遂口眼喎斜語澁抽掣者為能透諸筋脉雄黃主惡瘡疔瘡透百節治疥癩亦以瘡疹毒氣不能出也麻

黃鮮肌泄邪氣惡氣消赤黑斑三藥治瘡疹當出而不
出者如自然出快者不須服也

八十九獨味麻黃湯治斑疹倒靨

右用麻黃三十寸去節蜜拌炒令香紫色爲度水一盞煎
至六分服當有人得此方后知兗州仙源縣值工筆李用
之子斑疹倒靨已至危困投此藥一服瘡子便出其應如
神未至胃爛便血者皆可治服

九十南金散治小兒瘡疹已出而復擱其勢甚危諸藥不効者
萬無一失

紫背荷葉糯米糖水

白殭蚕直者去絲

右爲細末各一錢七小兒半錢研胡荽汁和酒下米飲亦
得本家在露貼印施人其全活者甚衆蓋藥有用訛腦入
牙齒者卒難得之唯此藥無毒而効速荷葉卒難得可於

鹽鋪內尋之

九十一滑石散治瘡瘻出膿恐壅癰黑色此藥滑竅令出快治
膈上煩熱多渴小便赤澀面青氣急大便不利者

滑石

甘草

石等分為細末每服一錢雞子清酒各少許調服

九十二橄欖核水治瘡子倒靨

右用橄欖子核中截斷水磨少許服立發

九十三快毒丹治小兒瘡疹氣勻即出快蓋血與氣相隨若內
有邪熱即血妄行使氣不勻大抵瘡疹氣快自勻宜快毒
丹瘡疹出皆服之

牽牛

黑者

木香

各一

肉苳蔻

半兩

青皮

生半兩

右為細末滴水和丸如黍米大每服七丸至十九滾煎茶

草葱白湯下乳前服之量其大小加減

九十四紅粉丹治臍肝熱瘡疹不勻

龍腦

細研一歲

壞子懸脂

天竺黃

硃砂

細研一兩

南星

日曬牛膽中百日内陰乾取末一兩

右五味煉蜜和搜為丸如鴉頭子大每服一九煎人參湯

化下

九十五乳香猪血膏治斑瘡不發

右以乳香研細用猪心血為丸如櫻桃大每服一九用水

磨化下

九十六紫金散治小兒瘡疹倒靨又出不快者

紫草

蛇退

炒焦

牛蒡子

炒各兩

石為龜末每服一錢水七分盡煎至四分去滓溫服不拘

時候蛇蛇治一切惡瘡十年不愈者亦用之良故也

九十七釣藤紫草散發斑疹令出快

釣藤釣子 紫草非

右等分爲細末每服一字或半錢用溫酒調下無時服紫
草滑緩利小便散諸十二經毒氣釣藤治小兒寒熱十二
驚癇今治瘡疹而用之素問云瘡瘍煩燥痛痺皆出於心
驚癇心病也瘡瘍亦心所主者故用也

九十八麝香猪血丸治小兒瘡疹不透

右旋取猪心血調麝香少許兩手心塗之并塗些小口唇
上即無極驗

九十九木星飲子治小兒瘡疹不出及出不快者

朱砂 一分 鬱金 半兩

右爲細末每服一字或二字量大小入龍腦少許以新汲
水茶脚少許同調勻然後刺猪耳血滴三點手入藥汁令

服不過一二時辰瘡子出便紅小兒無他瘡神効本草
云鬱金辛寒主血積下氣生肌上血破惡血氣聚血金瘡
以意詳瘡疹出於心也由熱而出也朱砂安心性微寒以
治熱也熱有所蘊蓄則壅聚而不出用鬱金者下氣消惡
血無壅聚則出出而不遲也

一百四聖散治瘡疹出不快及倒靨

紫草

木通

甘草炙

枳殼炙炒

黃芪

切焙

右件等分為麤末每服一錢水一中盞煎六分去粗溫服
一百一脫殼散

右以鷄子抱出殼子於新瓦上焙乾去膜取殼搗研如粉
細遇小兒斑疹倒靨不出或臟腑熱血糞黑頭瘡昏瞤
不能用酒調一字塗兒唇上令兒舐或以酒調塗風池背

上心前此名脫殼散或以熱湯調一字服之

一百二山梔子湯治瘡疹及斑毒狀如蚊蚤所咬毒盛黑色者

山梔子仁

白鮮皮

赤芍藥

升麻各一

寒水石

甘草

炙各半

右件為細末每服一錢水八分盞入紫草薄荷各少許同

煎至五分去滓放溫服

一百三化毒散

鬱金一枚

甘草

炙一

右用水半碗同煎令水乾去甘草將鬱金切作片令乾為末入生腦子半錢研令勻用猪血研成稀膏子煎薄苛湯化下一錢不過一服其毒氣從手足心出乃差此五疔一生之候若便血蒼懷無膿者十死不治一法可用蠅蛻末一錢好腦子一皂角子大大猪心三皂子大和作膏子

用熱酒浸紫草令溫化下服移時身上發大靨瘡毒頓出
然後依證調治

一百四宣毒膏治毒氣盛瘡疹已出不快倒靨急服此藥經
大効

獐猪血

先臘八日取後尾血
并用新瓦器盛

好硃砂

細研揀乳香

細研

甘草

炙為末

馬牙硝

各半

片腦

麝香

右件一處同猪血拌勻用一寬新竹筒底節一箇盡入諸
藥在筒內用密紙數重繫定於大糞坑屋梁上至清明日
取出曝乾更入腦麝各一錢細研勻滴水丸如皂角子大
煎人參湯化下一丸若毒盛瘡黑靨服之若瘡疹紅活再
長神驗

一百五百祥丸治瘡疹黑陷而耳聾反熱者為逆也用百祥丸
牛李膏各三服而不愈又云紫黑乳陷者百祥丸下之

黑者謹勿下又云黑者無問何時十難救一其候或寒戰
噤牙或耳黃腫紫宜急以百祥丸下之下之復惡寒不已
身冷汗耳聾反熱者死病也得身溫欲飲水可治又云瘡
黑陷而不發寒病未困也遂用百祥丸為藥以牛李膏為
助各一大服五日而復紅活七日而愈

右紅芽大戟不以多少陰乾漿水煮軟去骨日中曝乾復
入汁中煮汁盡焙乾為末水丸如粟大每服一二十丸研
赤芝麻湯下吐利同無時

一百六牛李膏治瘡疽倒靨又云已出未出快者宜服紫草散
玳瑁散之類重者以牛李膏又云治小兒瘡疹毒氣不
出不快及觸犯黑色者宜用之又云奪命膏

右用黑熟牛李子七八月內採於盆內研汁生絹烈去滓
用銀器盛慢火熬成膏磁器內以常令透風每服一皂角

子大煎杏膠化如入行二十里_不進一服其瘡疹自然紅色毒氣慢此藥神妙一切瘡疹出不快並可服錢_不同名牛李膏又云必勝膏云至秋結實黑圓成穗無生者市肆中乾者為末水熬代用董汲治小兒瘡疹痘疤惡候見_皮膚下不出或出不快長及紫黑乾陷亦用此藥仍云沒小年病此惡候極危殆父母不忍見之遇錢乙下此藥得安因懇求得真方遂傳於世_惟於收時不知早晚故無全效今并收時載之九月後收取研濾成膏每膏二兩研入好麝香半錢收貯不津器中九篇衛生方同但用挑膠半兩牛李子一兩炒為糞末每服一錢水七分盞煎至四分去滓溫服治瘰亦同

一百七倍金散治小兒瘡痘倒靨黑色

鼠粘子

_炒

二神麴

_炒

牛

減扶華

山果子

_{連核}

一兩

一兩

右為龜末每服一錢水八分盞入荊芥 穗紫草十根同

煎至四分去粗溫服

一百八拾聖凡治小兒斑瘡不出反入方

右取用十二月老鴉左翅不計多少風中令乾衣日燒為

灰用中等獺猪背上刺血為匕如鷄頭實大每服一丸取

獺猪尾上血少許溫水同化下未效二三時問再一服

一百九濕生蟲散治瘡子倒靨

右用濕生虫不計多少焙乾為末酒調下一字

一百一十白花蛇散治大人小兒瘡子倒靨

白花蛇燒骨一兩火灸令乾勿焦 大丁香二枚

右為細末每服一錢小兒半錢以水解淡酒調下如黑靨

者服之移時重紅生如聖

○毒氣滿盛而下第十一

一百十一 敗毒牛黃丹 瘡子出定大便不通瘡中瘡什不乾

真牛黃

大黃

未各

粉霜

珍珠

未各

右件同研勻煉蜜和丸如黍米大每服十粒煎人參湯下
量兒大小加減

一百十二 大黃丸 治瘡痂起而能食以此藥下之錢氏維云此
未可以能食為有熱而便下須有他證相表裏方可下且
瘡痂起而能食也而腹滿腹滿而不大便不大便而喘急
喘急甚而謔語者方可下下之藥但能去熱毒不為瘡
痘之害若瘡痂起而能食一證便下之下之則不穩蓋熱
氣未深故也如傷寒發厥須在六七日已後蓋氣深方能
發破破而下之表裏皆解傷寒則汗解蘊熱則瘡疹出矣

大黃

一兩酒洗

黑牽牛

各半生半熟

川芎

半兩

甘草

炙

右為田三糯米糊為丸如麻子大每服量大小加滋蜜湯
送下以溼利為度

一百十三川黃散治麤及斑瘡大便不通

大黃剉散

川芎剉一

甘草炙

黃芩

枳殼炒半兩

右為散末每服一錢水一小盞紫草少許同煮至半小盞
去滓溫服不拘時候瘡而大便不通不為害者則不下
其為害可下者證大便不通欲大便而不得通不得通而
腹脹滿心胃悶喘急面赤睡中譫語有諸證即可下又看
熱氣淺深藥有多少輕重也又有諸熱證大便如膏也又
不可下熱在表故也當與小柴胡湯五苓散治之
一百十四大承氣湯治昏甚譫語妄言大便不通腹脹之心脈
下有汗目睛黃赤喘急者當用之

厚朴

八兩

大黃

四兩

枳實

一兩

右為麤末每服五錢水半盞煎至二分入芒硝一合去滓溫服不拘時候

○瘧瘵病中表裏感寒或吐或利者第十二

一百十五益黃散治小兒胃冷嘔吐脾虛泄瀉又治患瘵因煩燥渴水飲冷過多暴傷脾胃或吐或瀉並宜服之

丁香

訶子

煨

青皮

去穢

陳皮

去白

木香

各一分

右為細末水半盞藥末一錢同煎至三分盞去滓溫服不

拘時候

一百十六參不九治小兒脾胃傷冷外熱裏寒不思飲食身常壯熱大便秘或澹色白或患瘵瘵身有大熱因食冷物或冷藥過變或瀉或腹脹或已出瘵瘵瘵白無血色此由裏寒

脾胃伏冷榮衛不行致令毒氣內伏不出宜服之其瘡癰
白死血色者皆從癰白四圍紅暈再起作膿結痂而愈

人參

白朮

乾薑炮

甘草炙各一分

右為細末米糕泡糊為丸如麻子大每服百餘丸溫水吞
下或米飲亦得乳食前服前世之書如仲景諸論治傷寒
云輕者用理中湯重者用四逆湯此乃胃足陽明經而感
寒邪脾胃乃為中州之府故用理中湯曰辛甘發散為陽
以退寒邪也理中湯煉蜜丸而嚙下曰理中丸蓋添蜜甘
以入脾胃嚙而便化於中焦今參朮丸以粳米糕為丸取
其難化服在脾胃滲漉漸得消化則中焦得煖脾土喜燥
其熱自歸此所以能治熱也

一百十七二和散治瘡瘡并傷寒冷熱不和陰陽痞隔氣不升

降服之調榮衛升降氣和冷熱消食快氣

藿香葉

香附子炒去毛

右等分為細末每服抄一字溫水調服不拘時候

一百十八六神散治脾胃虛弱津液燥少內虛不食身發熱

人參

白朮

茯苓

甘草炙

白扁豆炒

黃耆蜜炙

右等分為細末每服抄二錢用水半盞生薑一片棗一枚

同煎至三分去滓溫服之不拘時候身熱甚者加烏梅少

許同煎服

一百十九治中湯治霍亂方作熱渴欲飲或飲冷水或食冷物

雖身熱其中寒不食嘔吐下利宜服之

人參

白朮

乾薑炮

甘草炙

青皮

陳皮去白

右等分為細末每服一錢用水半盞煎至三分去滓溫服

不拘時候量大小服之

一百二十胃風湯證候并方見集驗方

一百二十一乾薑甘草湯治瘡疹服冷藥太過咳嗽手足冷脉遲者自利嘔吐不食

乾薑炮 甘草炙各四兩

右剉為散水一升二合煎至四合去滓溫服

一百二十二胃愛散調理小兒脾胃吐瀉如斑瘡未出醫者不識形候便將冷藥冰却瘡子致令內伏不出將此胃愛散調理如身體汗即不用控心散發也如无汗即控心散發之後下羌活散胃愛散

糯米一兩 乾淡木瓜三分 甘草一分 丁香附子各六分

藿香葉 紫蘇葉各一分

右件藥同一處令乾碾為細末分一錢或半錢煎粟米

藥子湯下

一百二十三勾氣湯取餘毒後調理

桔梗

洗淨乾

甘草

炙二兩

白乾薑

一分縮砂

陳皮

去白

茴香

各一兩洗

右為細末每服半錢或一錢用霜木瓜煎湯調下或用紫

蘇鹽煎湯送下

一百二十四豆乳散治小兒瘡疹間偶滑泄不止甚者宜服之

肉豆蔻

一枚

乳香

一豆大

右為細末米飲調下

一百二十五薑附湯治瘡疹半出而半不出或出盛時却下利

支厥嘔逆腹脹吃噎須急與理中丸四逆薑附湯之類不

須疑已試之驗也大便自利腹脹者是熱毒被冷所搐不

能出冷甚則為下利其毒小得出則為腹脹當此以理中

九四逆薑附湯等服之重後溫則利止熱毒得從利則腹脹自消瘡疹亦自出矣又有瘡疹半出半未出或出盛時却大便不通小便赤澀喘滿腹脹而唇齒乾口燥渴引飲譫語者當急下之此證是毒氣壅聚欲出而出不辨故腹脹下之熱毒散榮衛伸則裏脹消外瘡出合溫合下皆得其宜不可不述之若下膿血而腹脹者又非此證宜服南金散乳香猪血膏理中丸薑附湯

方見寒門

四逆湯方見傷寒門

一百二十六七珍散調胃進食滋養榮衛

人參

茯苓

白朮

山藥

黃耆

蜜炙

甘草

炙

白扁豆

炒

右等分為細末每服抄二錢水一盞生薑三十片炙子一枚

同煎至六分蓋連滓溫服不拘小次加粟米半升參散
此藥大能進食昔人患不食用諸藥皆不効後用此數日
飲食大進脾土居中燥濕皆非所宜但得其中則水升火
降脾愛穀味也

一百二十七薤白湯治瘡疹下利黃赤膿血及身熱

薤白

切半

豆豉

一盞

山梔子

十枚

右用水五盞同煎薤白爛為度去滓量大小服之解去惡
積也

○瘡子因吐利內虛自陷者第十三

一百二十八活血散治是瘡疹證不出或出而遲或出而倒靨
者皆宜服之

右用白芍藥炒為細末用溫酒調服或入酒一匙則出快
如欲止痛者只用溫熱水調服之以意尋之此乃調榮衛

藥也蓋張氏妙選方云瘡疹氣勾即出快氣行由榮衛無阻矣又為藥主時行寒熱消腫則治瘡痘矣素問論腳受血而能行目受血而能視手受血而能握物活人書一證感寒寸大尺弱兩足拘攣為下焦血少不能伸用芍藥甘草湯三服遂脚伸不拘攣能行常用有效又有老貴人不能拜跪宣醫用六辛湯乃是白芍藥六兩甘草半兩服十日而能行此亦活血散行榮衛也

一百二十九人齒散治瘡疹已出而不快既出而倒靨患瘡疹作寒熱而脉反遲者或攻皮膚而出遲或面額赤脉不洪大者或服涼藥過多血凝氣弱或出其未快照王夷甫間以酒調服之錢一附方治瘡疹倒靨入麝香酒調服之尤佳又云瘡疹倒靨不出加赤小豆七粒薄荷酒調服之若黑色者名曰鬼瘡子用獾猪人乳下二錢炙時再服之

右用人齒脫落者以麋鹿固濟六八服令通方。今取出
為末用薄荷酒調服之半錢良久脈平毒氣散瘡。粟米
而出詳之此為發出瘡疹之藥也如傷寒表汗之藥。如傷
寒發汗須看榮衛之淺深瘡疹表出須看蘊熱之多少也
恐蘊熱少而用藥過為斑爛故也其已出而未快者古血
散猴藜酒葡萄酒之類可也既出而倒靨者須人齒散則
病藥與稟受弱人三者皆相當也不尔則病輕藥重反以
為累也後人不能究其毒氣輕重一藥用藥因茲大損者
多昔有士貴之家患瘡疹已出而稍遲遂用正氣散加白
芍藥又用胡荽酒猴藜酒亦出遲渠家云大抵醫家用藥
大緩自夜來燒人齒五个酒調服之一身瘡疹俱出駭聞
渠用遂再診視脈已微觀腦後并兩脚盡白色是榮衛弱
熱毒少而藥力過則陽氣少而无以應接故死血色也告

云陽氣盡出表外今裏寒氣成燥必濡瀉急以二氣丹為小丸服至半兩水瀉二日方止又服內補散治瘡痘其瘡痘服人齒散表過為斑爛通體為一將息月餘方愈其人精神稍緩蓋耗竭心液故也詳人務治妳乳癰破腫出箭鏃則表瘡疹甚驗若慢用早則一變十不可勝數為斑爛為虛脫為裏寒不可不知又有田舍及市井間小兒患瘡痘中行走當風任服朴硝大黃之類無害者恐富貴之稟非負荷者比各隨宜而治前云服人齒散嗽微而瘡色白為外陽微濡瀉為內陰盛自非先用二氣丹後尚濡瀉若用之遲豈不為虛脫也

一百三十內補散治小兒正患瘡疹中或感外寒或以湯水冷或服冷藥過多因生吐瀉脾虛血澁瘡疹遲遲不出肌膚瘦而無血色裏服諸調脾胃藥小兒此可以治血氣瘡

毒得出

人參

黃芪

白芷

當歸

肉桂

桔梗炒

川芎

木香

甘草炙

防風

厚朴薑製

阿膠炒

橘皮去白

右等分為細末每服一錢入酒二匙溫湯浸調服之不拘時候王子建云仲景論證多而用藥少男子詳而婦人畧云此乃穿鑿之過若使仲景存日其方有餘用蓋無壞病矣今則醫者治病恒紛紛擾擾為利是圖動輒差悞後賢處方救其不及是乃方愈多皆是救差悞爾治瘡疹用內補散亦救其差悞爾但俗人常云瘡疹是熱毒見其藥稍溫便以為悞此不審之過也殊不知傷寒是傷其寒却有間或用大黃朴硝升麻知母之類此皆救一時不及若不

述此恐人執而不秘一向偏見使緩急療病意識不能完

備疑謀敗事者多矣

○解利餘毒第十四

赤茯苓

甘草炙

大青

升麻

枳殼

炙炒各

梔子

一分

右為麤末每服一錢水一小盞入若竹葉一七片豆豉三十粒同煎至五分盞去滓分為三服日三四服青兒大小以意加減本方稱疹痘出後脇痛者由病後毒氣滯亂阻於升降左右為陰陽之道路氣之所行處令氣滯為脇痛以枳殼寬腸下氣令氣順脇不痛也大青梔子去毒熱升麻解毒赤茯苓導心火利小腸無熱以克肺氣而逆自平爾

一百三十二小柴胡湯治發熱甚而不可宜服之

柴胡

人參

黃芩 三

甘草 炙

半夏

各二兩半
湯飽七次

右為耑末每服三錢水一盞生薑二片棗子一枚后煎至半盞去滓溫服咳嗽者加五味子前服頭痛發熱夜中寒痛者四味升麻湯大便不通者四順飲若大便自利黃黑色者此毒亦有所出不必廣與湯劑恐重增他病大便自然通不得以溫藥助之瘡疹亦稀少自快利只與四味升麻湯荆芥散雖大便利不可以溫藥助之其下利甚者却與少溫之

一百三十三大青四物湯治熱病十日已上發汗又吐利後熱不除身上斑出

大青 四兩

豆豉 八合

阿膠

甘草

炙各一兩

右劉如麻豆每服抄五錢水一盞煎至六分去滓入膠煎令化服

一百三十四沙糖水治瘡子作膿窠了是毒氣已盡出在肌但末結靨者

右宜調沙糖水與喫瘡子將欲乾時須與兒搗去茄令血出則定無癰子若從他至乾定隱一癰子也後人見喫沙糖水瘡乾不問毒氣出與不出盡便與沙糖水喫損目者多矣蓋嘗瘡疹結成膿疱是毒氣出盡在肌膚可服之也設或尚爾血疱未成膿疱乃毒未出盡便喫沙糖水則損目蓋患瘡疹兒食糖蜜棗柿即瘡入目及患瘡疹兒食鴨卵食其兒開卵氣目中即生翳膜更不可食

一百三十五藍根散

板藍根

一兩

甘草

炙三

右同劉為細末每服半錢或一錢用雄雞冠上二兩點同溫酒少許食後同調下

一百三十六甘露飲解胃熱及小兒瘡疹已發後餘毒後居熱溫壯齒斷宣腫牙痛不能嚼物飢而不欲食噴以黃芩及病後瘡癰乳母俱可服

甘草

山茵陳

石斛

枳殼炒

黃芩

枇杷葉

生地黃

麥門冬去心

右等分為籠末每服抄二錢水一盞同煎至八分食後溫服牙齒動搖牙斷腫熱含漱并服

一百三十七槐花散治斑瘡餘熱不退

槐花

赤小豆

各二錢 蘇香少許

右為細末每服半錢蜜湯調服不拘時候

一百三十八辟心散治瘡瘡出欲盡便服之如入眼即自退

蛇蛻一條

不蛀皂角十莖

甘草生用

右為細末每服一錢熱水調下小兒半錢

一百三十九青金丹治小兒瘡疹病後取下餘毒

滑石末

白丁香研過天南星

青黛細羅

輕粉

水銀各二錢先以錫二錢於鍋內燒化

川巴豆

去皮心腹七十二片無缺損者用并花水浸一宿懸於當風吹乾爛研

右件藥用拌和勻用軟飯為丸如梧桐子大巴豆不出油

依形證用湯使傷寒後取積淡煎葱白湯送下取甘蟲用

牛肉汁下驚風肚中緊硬面青黑用金銀薄寄葱白湯下

。因傷着肚中及腹皮上微熱腹脹夜間作熱炒下是

疳面青黃色眼微黃肚腹中有積用皂角子二二五五下

煨過水一盞煎至半盞送下此藥有積作鴈魚鮓以下氣

積炒茴香湯下凡下此藥周歲一曰九二歲一曰九七歲

二十四丸看大小加減下須是日初天黃連下黃芩盡時可依形證候下藥補之臨服此藥恐先吐下些小涎亦不妨

一百四十黃芩散治瘡毒出盡後服之恐瘡毒入骨

黃芩

山梔子

黃丹

右等分爲細末用牛蒡子葉取汁調塗於頂門

一百四十一燈心湯治瘡痘出後煩喘小便不利者宜進之

燈心一把

驚甲

醋炙黃二兩

右剉爲散每服一兩用水八合煎取四分服之各量大小

加減服之

一百四十二黃耆散治壯熱不退可涼肌膚散熱

黃芪

柴胡

乾葛

甘草

炙各等分

右爲末每服一錢薄奇三葉水半盞煎至三分約三呷空

心服此藥治發熱數日未退者其熱是瘡疹考量其虛實用之也

一百四十三朱砂膏治小兒驚積驚熱病後可常服

朱砂

半兩

鵬砂

馬牙硝

各三錢

真珠末

一錢

玄明粉

二錢已上并研

片腦

麝香

各一錢

右件各為末於一處拌合和用好蜜煉成膏如小兒諸般驚用藥一黃豆大常用金銀薄剪湯少許化開下如遍身潮熱用甘草煎湯化下一臘及一月內小兒不通下藥可以藥用乳調塗妳上令小兒喫乳下

一百四十四宣風散治身熱煩渴腹滿而喘大小便不通悶亂大吐當利其小便不瘥者宜服之

檳榔

二箇

陳皮

去白

甘草

炙各半兩

牽牛

四兩用半

右為細末三兩歲用蠟湯調下三歲已上者

前服

一百四十五甘桔湯治瘡疹咽喉疼痛生瘡者服之

甘草

炒二兩

桔梗

味乾

水浸一宿

用一宿

右為細末每服二大錢水一盞煎至五分食後

五月文

熱手搏眉目鼻面加阿膠半片炒過同煎至五分服

一百四十六定命朱砂散治小兒瘡疹毒氣不出或出後乾黑

色服此藥發出毒氣其瘡子細紅而出也此方係出瘡子

倒壓門中

朱砂

半兩

生龍腦

滴乳香

馬牙

石

各四味

甘草

二錢

右五味研勻用臘月新獺猪血半升同研勻取青竹筒長

二尺留兩節開一頭作窠子注藥在內黃蠟塞定以油絹

緊裹封勿令透氣埋地坑中至一百五日取出水洗

中四十九日劈開取葉研為細末每服半錢新汲水下

一百四十七鼠粘子湯是瘡疹出太盛解毒門內消毒散加防

風治療其方同

一百四十八斑瘡入眼目方

牛蒡子

人參

各二兩

右同研為細末每服二錢糯米薄粥調下神効不可具述

治瘡疹出不~~盡~~既出不正色

先用粉~~葛~~葛一味為細末每服三錢用雄鷄頭一箇搗爛

入乾葛末在內每用水二鍾煎至一鍾去粗服其驗如神